



**ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
дубна**

P2-87-256

Нгуен Суан Хан

**САМОСОГЛАСОВАННОЕ КВАНТОВАНИЕ
НЕАБЕЛЕВОЙ ТЕОРИИ
В АКСИАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКЕ**

Направлено в журнал "Известия высших
учебных заведений - Физика"

1987

Введение

Аксиальная калибровка $A_3 = 0$, предложенная впервые в работе ^{/1/}, является линейной калибровкой, где не возникают т.н. духи Фаддеева – Попова ^{/2/}. Поэтому она играет важную роль в пертурбативных вычислениях неабелевых теорий ^{/3/}.

Первая попытка получения гамильтоновой формулировки в аксиальной калибровке была выполнена Арновиттом и Фиклером ^{/1/}. Однако Шингер впоследствии показал, что их результаты не согласованы с граничными условиями, которым подчиняются физические переменные поля, для того, чтобы гамильтониан был свободен от бесконечности ^{/4/}. Устранение этой сингулярности было выполнено Чодосом ^{/5/}, но коммутационные соотношения в ^{/5/} ещё не согласуются с гипотезой об исчезающем поле в пространственной бесконечности.

Основная цель данной работы состоит в построении самосогласованной гамильтоновой формулировки калибровочной теории в аксиальной калибровке, свободной от указанных выше трудностей. Для этого мы используем минимальное каноническое квантование неабелевой теории, предложенной в работах ^{/6-8/}. В отличие от результата Чодоса, полученные коммутационные соотношения не только приводят к правильным уравнениям движения, к удовлетворению критерия лоренц-инвариантности Шингера ^{/9/}, но и согласуются с тем, что все компоненты электрического и магнитного полей исчезают на пространственной бесконечности. Вследствие этого гамильтониан, выраженный в терминах этих полей, конечен и хорошо определен. Это связано с использованием минимальной схемы квантования, которая позволяет выделить поперечные поля единственным образом и отделить их от нулевой моды, не исчезающей в пространственной бесконечности.

В первом разделе приведены основные моменты схемы минимального квантования и результаты последовательной гамильтоновой формулировки калибровочной теории в терминах калибровочно-инвариантных поперечных переменных ^{/7,8/}. Во втором разделе выводятся коммутационные соотношения с помощью точечного операторного калибровочного преобразования, проверяется лоренц-инвариантность схемы в аксиальной калибровке и строится соответствующий функциональный интеграл.

I. Выделение поперечных переменных

Рассмотрим теорию Янга - Миллса с лагранжианом.

$$\mathcal{L}(\alpha) = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu}^a)^2 + \bar{\psi}(i\gamma_\mu \nabla_\mu - m)\psi, S = \int d^4x \mathcal{L}(\alpha),$$

$$\begin{aligned}\nabla_\mu &= \partial_\mu + \hat{A}_\mu, \quad \hat{A}_\mu = g \frac{A_\mu^a \tau_a}{2i}, \\ F_{\mu\nu}^a &= \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g \epsilon_{abc} A_\mu^b A_\nu^c,\end{aligned}\quad (I)$$

который инвариантен относительно калибровочных преобразований

$$\hat{A}_\mu^a = g (\hat{A}_\mu + \partial_\mu) g^{-1}, \quad \psi^g = g \psi, \quad (2)$$

где $g(\vec{x}, t)$ есть матрица со значениями в группе $SU(2)$ (или $SU(N)$). Для построения гамильтониана теории необходимо явно выделить истинные динамические переменные $\overset{(10)}{A_i^a}$. С этой целью образуем уравнение связи - классическое уравнение на компоненты A_o^a , не имеющие канонического импульса

$$\begin{aligned}\frac{\delta S}{\delta A_o^a} &= 0 \Rightarrow (\nabla_i^2 A_o)^a - \nabla_i^{ab} \partial_o A_i^b = j_o^a, \\ (\nabla_i^{ab})_i &= \delta^{ab} \partial_i + g \epsilon_{abc} A_i^c, \quad j_o^a = g \bar{\psi} \gamma_\mu \overset{(3)}{\tau}^a \psi.\end{aligned}$$

Формальное решение (3) можно представить в виде

$$A_o^a = \partial_o \zeta(\ell) \Phi^a + \left[\frac{1}{\nabla_i^2} \right]_{Reg}^{ab} [(\nabla_i \partial_o A_i)^b + j_o^b], \quad (4)$$

где $\nabla_i^2 \Phi^a = 0$. Коэффициент $\zeta(\ell)$ играет роль нулевой моды, которая как было показано в работе $\overset{16}{/}$, описывает инфракрасные особенности неабелевой теории в пространственной бесконечности и может приводить:

- 1) к нарушению обычной релятивистской инвариантности теории,
- 2) к неисчезающим вакуумным глюонным полям ($E \neq 0, B \neq 0$),
- 3) к добавлению бесконечной величины энергии вакуума в гамильтониан системы.

Поэтому в данной работе первое слагаемое в (4) не рассматриваем. Это означает, что мы используем класс основных функций квантовой теории поля, убывающих на пространственной бесконечности. При этом оператор $\nabla_i^2 \overset{-2}{J}$ будет хорошо определен. Лагранжиан (I) с учетом решения (4) в терминах калибровочно-инвариантных поперечных переменных A_i^T , ψ^T имеет вид $\overset{7,8}{/}$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\alpha) &= \frac{1}{2} [F_{oi}(A^T)]^2 - \frac{1}{4} [F_{ij}(A^T)]^2 - j_i^T A_i^T + \\ &+ \frac{1}{2} j_o^T \frac{1}{\nabla^2} j_o^T + \bar{\psi}^T (i \gamma_\mu \partial_\mu - m) \psi^T,\end{aligned}\quad (5)$$

где

$$\begin{aligned}F_{oi}(A^T) &= (\delta_{ij} - \partial_i \frac{1}{\nabla^2} \gamma_j) F_{oj}^T - \partial_i \frac{1}{\nabla^2} j_o^T, \\ F_{oi}^T &= \partial_o A_i^T, \quad \nabla^2 = \nabla_i \partial_i.\end{aligned}\quad (6)$$

Этот лагранжиан точно совпадает с лагранжианом в кулоновской калибровке. Здесь и в дальнейшем, где нет необходимости явно выписывать цветовые индексы, мы их опускаем.

Физические наблюдаемые (гамильтониан, импульс, и т.д.) можно выразить только в терминах калибровочно-инвариантных переменных A_i^T , ψ^T , если использовать для их построения калибровочно - инвариантный тензор энергии - импульса Белинфанте.

$$T_{\mu\nu} = F_{\mu i} F_{i\nu} + \bar{\psi} (i \gamma_\mu \nabla_\nu) \psi - g_{\mu\nu} \mathcal{L} + \frac{i}{2} \partial_\lambda (\bar{\psi} \overset{T}{\gamma}_{\lambda\mu\nu} \psi), \quad (7)$$

где

$$G_{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2} [\delta_{\lambda i} \delta_\mu \gamma_\nu + \delta_{\mu i} \delta_\lambda \gamma_\nu - \delta_{\nu i} \delta_\lambda \gamma_\mu].$$

Гамильтониан, импульс и тензор Лоренца имеют следующий вид:

$$\begin{aligned}H &= \int d^3x T_{00} = \int d^3x \left\{ \frac{1}{2} F_{oi}^2 + \frac{1}{4} F_{ij}^2 + \bar{\psi}^T (i \gamma_\mu \nabla_\mu + m) \psi^T \right\}, \\ P_K &= \int d^3x T_{0K} = \int d^3x \left\{ F_{oi} F_{Ki} + \psi^T \overset{T}{\gamma}_i \nabla_K \psi^T + \frac{i}{4} \partial_i (\psi^T \overset{T}{\gamma}_{iK} \delta_{iK} \psi^T) \right\}, \\ M_{0K} &= \omega_K H - t P_K + \int d^3x (\omega_K - \omega_K) T_{00}.\end{aligned}\quad (8)$$

В соответствии с предписаниями канонического квантования, поля A_i^T и $F_{oi}(A^T)$ считаются независимыми переменными. Поскольку они тождественно удовлетворяют условию поперечности $\partial_i A_i^T = 0$ и уравнению Гаусса $\nabla_i F_{oi} = j_o^T$, то мы должны выбрать коммутационные соотношения, тождественно удовлетворяющие обоим условиям

$$\begin{aligned}i [F_{oi}^a(\vec{x}, t), A_j^T(\vec{y}, t)] &= (\delta_{ij} \delta^{ab} - \partial_i (\frac{1}{\nabla^2} \gamma_j)^{ab}) \delta^3(\vec{x} - \vec{y}), \\ \{ \psi_\alpha^T(\vec{x}, t), \psi_\beta^T(\vec{y}, t) \} &= \delta_{\alpha\beta} \delta^3(\vec{x} - \vec{y}).\end{aligned}\quad (9)$$

В этом случае квантование поперечных калибровочно-инвариантных переменных A_i^T , ψ^T полностью совпадает со схемой операторного квантования Шингера, изложенной в $\overset{9}{/}$, где рассмотрены все вопросы доказательства релятивистской ковариантности теории, трансформационные свойства полей A_i^T , ψ^T и выбор контрчленов, связанных с упорядочиванием операторов в нелинейном гамильтониане.

2. Аксиальная калибровка

Для перехода от кулоновской калибровки совершим точечное операторное преобразование /II/

$$\begin{aligned} {}^{(3)}\hat{A}_i &= \mathcal{U}_3(A^T)(\hat{A}_i^T + \partial_i)\mathcal{U}_3(A^T)^{-1}, \\ {}^{(3)}\psi &= \mathcal{U}_3(A^T)\psi^T, \\ {}^{(3)}F_{oi} &= \mathcal{U}_3(A^T)F_{oi}(A^T)\mathcal{U}_3(A^T), \end{aligned} \quad (10)$$

которое эффективно ведет к выбору другой калибровки. В частности, в аксиальной калибровке ${}^{(3)}A_3 = 0$ находим

$$\begin{aligned} \partial_3 \mathcal{U}_3(A^T) &= \mathcal{U}_3(A^T)\hat{A}_3^T, \\ \mathcal{U}_3(A^T) &= T_2 \exp\left\{\frac{1}{2}\hat{A}_3^T\right\} = T_2 \exp\left\{\frac{1}{2}\partial_I \hat{A}_I^T\right\}, \end{aligned} \quad (II)$$

$I=1,2$.

Переменные ${}^{(3)}A_I$, ${}^{(3)}\psi$ также инвариантны относительно калибровочных преобразований исходных полей A_i , ψ , так как они выражаются через инвариантные переменные A_i^T , ψ^T .

С учетом (10,II) "аксиальные поля" ${}^{(3)}A_I$ определяются в явном виде формулой

$${}^{(3)}A_I = \left(\delta_{Ix} - \partial_I \frac{1}{2} \delta_{3i}\right) A_i^T. \quad (12)$$

В аксиальной калибровке имеем

$$\begin{aligned} {}^{(3)}F_{ox} &= \mathcal{U}_3(A^T)F_{ox}(A^T)\mathcal{U}_3(A^T)^{-1}, \\ {}^{(3)}F_{o3} &= -\frac{1}{2} (\nabla_I {}^{(3)}F_{ox} - J_o^3), \quad J_o^3 = \mathcal{U}_3 J_o^T \mathcal{U}_3^{-1}. \end{aligned} \quad (13)$$

Используя (9,12,13), найдем следующие коммутационные соотношения:

$$\begin{aligned} i [{}^{(3)}F_{ox}(\vec{x}, t), {}^{(3)}A_K(\vec{y}, t)] &= \delta^{ab} \delta_{IK} \delta^3(\vec{x} - \vec{y}), \\ \{ {}^{(3)}\psi_\alpha(\vec{x}, t), {}^{(3)}\psi_\beta^+(\vec{y}, t) \} &= \delta_{\alpha\beta} \delta^3(\vec{x} - \vec{y}), \\ i [{}^{(3)}F_{o3}^a(\vec{x}, t), {}^{(3)}A_K^b(\vec{y}, t)] &= \theta(y_3 - x_3) \nabla_K^{ab} \delta^3(x_I - y_I), \end{aligned} \quad (14)$$

$$[{}^{(3)}F_{IK}^a(\vec{x}, t), {}^{(3)}F_o^b(\vec{y}, t)] = \delta(x_3 - y_3) [\delta_{IL} \nabla_K^{ab} - \delta_{KL} \nabla_I^{ab}] \delta^3(x_I - y_I),$$

которые индуцированы аналогичными коммутационными соотношениями, записанными в кулоновской калибровке; заметим, что в аксиальной калибровке

$$[{}^{(3)}F_{ox}(\vec{x}, t), {}^{(3)}F_{oK}(\vec{y}, t)] = 0, \quad [{}^{(3)}F_{IK}(\vec{x}, t), {}^{(3)}F_{oI}(\vec{y}, t)] = 0.$$

Поэтому в отличие от кулоновской калибровки здесь не возникает проблем упорядочивания базе-операторов.

В терминах калибровочно-инвариантных переменных ${}^{(3)}A_I$, ${}^{(3)}\psi$ гамильтониан, импульс и тензор Лоренца имеют следующие формы:

$$\begin{aligned} H &= \int d^3x T_{00} = \int d^3x \left\{ \frac{1}{2} {}^{(3)}F_{ox}^2 + \frac{1}{2} {}^{(3)}F_{o3}^2 + \frac{1}{4} F_{IK}^2 + \frac{1}{2} (\partial_3 {}^{(3)}A_I)^2 + \right. \\ &\quad \left. + {}^{(3)}\bar{\psi} (i \delta_I \partial_3 + m) {}^{(3)}\psi + {}^{(3)}\bar{\psi}^+ i \delta_3 \partial_3 {}^{(3)}\psi \right\}, \\ P_I &= \int d^3x \left\{ {}^{(3)}F_{oK} F_{IK} - {}^{(3)}F_{o3} \partial_3 {}^{(3)}A_I + {}^{(3)}\psi^+ i \partial_I {}^{(3)}\psi + \frac{i}{2} \partial_I ({}^{(3)}\psi + [{}^{(3)}\delta_I, {}^{(3)}\psi]) \right\}, \\ P_3 &= \int d^3x \left\{ {}^{(3)}F_{ox} \partial_3 {}^{(3)}A_K + {}^{(3)}\psi^+ i \partial_3 {}^{(3)}\psi + \frac{i}{4} \partial_I ({}^{(3)}\psi + [{}^{(3)}\delta_I, {}^{(3)}\psi]) \right\}, \quad (15) \\ M_{oi} &= x_i H - t P_i + \int d^3x (y_i - x_i) T_{00}, \end{aligned}$$

где $i = 1, 2, 3$; $I, K = 1, 2$.

Используя полученные коммутационные соотношения (19-22), легко показать, что операторы (15) удовлетворяют алгебре полной группы преобразований Цуанкаре.

В такой теории выполняются соотношения Гейзенберга

$$i [P_\mu, {}^{(3)}\psi(x)] = \frac{\partial {}^{(3)}\psi(x)}{\partial x^\mu}, \quad i [P_\mu, {}^{(3)}A_I] = \frac{\partial {}^{(3)}A_I}{\partial x^\mu}$$

и критерий лоренц-инвариантности Шингера

$$\frac{1}{i} [T_{00}(x), T_{00}(y)] = - (T_{0i}(x) + T_{oi}(y)) \partial_i \delta^3(\vec{x} - \vec{y}),$$

что также доказывается непосредственным вычислением. Совершая бесконечный малый лоренц-поворот (генерируемый бустом M_{oi}), можно увидеть, что операторы ${}^{(3)}A_I$, ${}^{(3)}\psi$ не приобретают никакой дополнительной калибровочной функции по сравнению с кулоновской калибровкой

$$\begin{aligned} i [M_{oi}, {}^{(3)}A_I(y)] &= y_0 \partial_i {}^{(3)}A_I - y_i \partial_0 {}^{(3)}A_I, \\ i [M_{oi}, {}^{(3)}\psi(y)] &= y_0 \partial_i {}^{(3)}\psi - y_i \partial_0 {}^{(3)}\psi. \end{aligned}$$

Таким образом, построенная нами теория лоренц-инвариантна. Коммутаци-

онные соотношения, полученные в формулировке Чодоса, не согласуются с гипотезой об исчезающем поле в пространственной бесконечности^{/12/}, поэтому алгебра полной группы преобразований Пуанкаре в^{/5/} является небоснованной. В нашем случае гамильтониан, выраженный формулой (15), приводит к правильным уравнениям движения, не содержит бесконечную величину энергии вакуума, поэтому он хорошо определен.

В заключение этого раздела по методу, предложенному в работе^{/13/}, можно написать функциональный интеграл в аксиальной калибровке

$$\mathcal{Z}, [\bar{\gamma}, \bar{\zeta}, J] = \int d\bar{\psi} d\psi \prod_{\alpha} d^4 A_{\mu}^{\alpha} \delta[A_{\mu}] \times \\ \times \exp \left\{ i S[A] + i \int d^4 x [\bar{\psi} \bar{\zeta} + \bar{\zeta} \psi + J_{\mu} A_{\mu}] \right\}.$$

Заключение

В работе предложена самосогласованная гамильтониановая формулировка калибровочной теории в аксиальной калибровке путем использования минимального канонического квантования^{/7,8/}. В этом методе удается выделить истинные поперечные переменные, которые удовлетворяют требованиям класса основных функций квантовой теории поля и имеют хорошее асимптотическое поведение в пространственной бесконечности. В терминах этих переменных гамильтониан, приводящий к правильным уравнениям движения, конечен и определен.

Автор благодарит Б.М. Барбашова, А.В. Ефремова, В.Н. Первушина, Ю.Л. Калиновского за обсуждение результатов настоящей работы.

Литература

1. Arnowitt R.L., Fickler S.I. Phys. Rev., 1962, 127, p. 1821.
2. Kummer W. Acta Phys. Austriaca 1975, 41, p. 315.
3. Dokshizer Yu.L., Dyakonov D.I., Troyan S.I. Phys. Rep., 1980, 58, p.270.
4. Schwinger J. Phys. Rev., 1962, 130, p. 402.
5. Alan Chodos. Phys. Rev., 1978, D17, p. 2624.
6. Pervushin V.N. Riv. Nuov. Cim., 1985, c.8, No 10, p. 1.
7. Ильева Н.П., Нгуен Суан Хан, Первушин В.Н. Ядерная физика, 1987, т.45, с.1169.
Preprint JINR, E2-86-283, Dubna, 1986.
8. Нгуен Суан Хан, Первушин В.Н. Препринт ОИЯИ Р2-86-645, Дубна, 1986 г.
9. Schwinger J. Phys. Rev., 1962, 127, p. 324.

10. Славнов А.А., Фаддеев Л.Д. Введение в квантовую теорию калибровочных полей - М: Наука, 1978, с. 77.
- II. Girotti H.O., Rothe H.J. Phys. Lett., 1982, IIAB, p. 257.
- I2. Simoes J.M., Girotti H.O. Ann. Phys., N.Y. 1986, 169, p. 1.
- I3. Fradkin E.S., Vilkovisky G.A. CERN preprint TH 2332, 1977.

Рукопись поступила в издательский отдел
16 апреля 1987 года.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ
ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Индекс	Тематика
1.	Экспериментальная физика высоких энергий
2.	Теоретическая физика высоких энергий
3.	Экспериментальная нейтронная физика
4.	Теоретическая физика низких энергий
5.	Математика
6.	Ядерная спектроскопия и радиохимия
7.	Физика тяжелых ионов
8.	Криогенника
9.	Ускорители
10.	Автоматизация обработки экспериментальных данных
11.	Вычислительная математика и техника
12.	Химия
13.	Техника физического эксперимента
14.	Исследования твердых тел и жидкостей ядерными методами
15.	Экспериментальная физика ядерных реакций при низких энергиях
16.	Дозиметрия и физика защиты
17.	Теория конденсированного состояния
18.	Использование результатов и методов фундаментальных физических исследований в смежных областях науки и техники
19.	Биофизика

Нгуен Суан Хан
Самосогласованное квантование неабелевой теории в аксиальной калибровке

P2-87-256

В работе предлагается самосогласованное квантование неабелевой теории в аксиальной калибровке. Она получается из кулоновской калибровки путем точечного операторного калибровочного преобразования в рамках "минимального" канонического квантования, основанного на явном решении уравнения связи. Здесь удается выделить истинные поперечные переменные единственным образом, в терминах которых гамильтониан системы конечен и определен.

Работа выполнена в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1987

Перевод автора

Nguyen Suan Han
Self-Consistent Quantization of a
Non-Abelian Theory in Axial Gauge

P2-87-256

A self-consistent quantization is suggested for a non-Abelian theory in axial gauge. The latter follows from the Coulomb gauge by a point-like operator gauge transformation within a minimal canonical quantization based on the explicit solution of a constraint equation. Here it appears to be possible to separate true transverse variables in a unique way, in terms of which the Hamiltonian is finite and definite.

The investigation has been performed at the Laboratory of Theoretical Physics, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1987