

С 17 а

5/111-21


Б-941
СООБЩЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОГО
ИНСТИТУТА
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна

2178/2-71

P5 - 5789

Л А Б О Р А Т О Р И Я В Ы Ч И С Л И Т Е Л Н О Й Т Е Х Н И К И
и А В Т О М А Т И ЗАЦИИ



5789

Б . Б ухбергер

О ВЕЛИЧИНАХ s_i , ОПРЕДЕЛЕННЫХ
РЕКУРСИЕЙ $s_{i+1} = u_i s_i + v_i s_{i-1}$

1971

P5 - 5789

Б. Бухбергер

О ВЕЛИЧИНАХ s_i , ОПРЕДЕЛЕННЫХ
РЕКУРСИЕЙ $s_{i+1} = u_i s_i + v_i s_{i-1}$

Бруно Бухбергер

P5-5789

О величинах S_i , определенных рекурсией $S_{i+1} = U_i S_i + V_i S_{i-1}$

В работе дается явный вид величин S_i , определенных рекурсией $S_{i+1} = U_i S_i + V_i S_{i-1}$ ($i \geq 2$), как функций от аргументов $S_1, S_2, U_2, V_2, \dots, U_{i-1}, V_{i-1}$. Полученная формула применяется к числам Фибоначчи и определителям трехдиагональных матриц.

Сообщения Объединенного института ядерных исследований

Дубна, 1971

Bruno Buchberger

P5-5789

On Values S_i Determined by Recursion $S_{i+1} = U_i S_i + V_i S_{i-1}$

An explicit form of value S_i , determined by recursion $S_{i+1} = U_i S_i + V_i S_{i-1}$ ($i \geq 2$) as a function of $S_1, S_2, U_2, V_2, \dots, U_{i-1}, V_{i-1}$ arguments, is given. The obtained formula is applied to Fibonacci numbers and to three-diagonal matrix determinants.

Communications of the Joint Institute for Nuclear Research.

Dubna, 1971

I. Постановка задачи

Рассмотрим величины S_i , определенные рекурсией:

$$(I.1) \quad S_{i+1} = u_i S_i + v_i S_{i-1}, \quad (i \geq 2),$$

где u_i, v_i ($i \geq 2$) и S_1, S_2 – элементы произвольного кольца K , например, вещественные числа. Естественно, тогда и $S_i \in K$ для $i \geq 3$. Обозначим зависимость величин S_i ($i \geq 3$) от $S_1, S_2, u_1, \dots, u_{i-1}, v_1, \dots, v_{i-1}$ следующим образом:

$$(I.2) \quad S_i = \sigma_i(S_1, S_2, u_2, \dots, u_{i-1}, v_2, \dots, v_{i-1}), \quad (i \geq 3).$$

Наша цель – дать явное представление этих функций σ_i .

Можно представить σ_i в виде:

$$(I.3) \quad \begin{aligned} \sigma_1(S_1) &= S_1, \\ \sigma_2(S_1, S_2) &= S_2, \\ \sigma_i(S_1, S_2, u_2, \dots, u_{i-1}, v_2, \dots, v_{i-1}) &= \\ &= v_2 \sigma_{i-2}(1, u_3, u_4, \dots, u_{i-1}, v_3, \dots, v_{i-1}) S_1 + \sigma_{i-1}(1, u_3, u_4, \dots, u_{i-1}, v_3, \dots, v_{i-1}) S_2, \end{aligned}$$


что легко проверяется подстановкой (I.3) в (I.1).

Поскольку в правой части равенства (I.3) первым аргументом функций σ_{i-1} и σ_{i-2} является 1, ограничимся в дальнейшем рассмотрением рекурсий вида (I.1), где $S_1 = 1$. Переобозначим тогда S_2 через u , (см. теорему 3.1).

2. Вспомогательные функции

Предварительно введем функции β и γ , которые в третьей главе будут играть важную роль. Наглядно функцию β можно описать следующей процедурой. Для нахождения значения $\beta(m, k, j, t)$ (m, k, j, t - целые числа, где $1 \leq m$, $0 \leq k \leq m$, $1 \leq j \leq \binom{m}{k}$, $1 \leq t \leq m$) запишем j -ое сочетание среди всех сочетаний k элементов из m , причем сочетания должны быть упорядочены способом, указанным ниже для случая $m = 5$, $k = 2$. Если при этом на нашем рисунке на t -ом месте j -ого сочетания стоит знак \circ , то полагаем $\beta(m, k, j, t) = 2$, в противном случае $\beta(m, k, j, t) = 1$.

Пример:



$$\beta(5, 2, 7, 2) = 1, \text{ а } \beta(5, 2, 3, 2) = 2.$$

Такое наглядное описание функции β , конечно, имеет только вспомогательный характер. Сейчас дадим строгое определение этой функции ($m \geq 1, k, j, t \geq 0$):

$$(2.1) \quad \beta(m, k, j, t) = \begin{cases} 1, & \text{если } k=0 \\ \beta(m-1, k-1, j, t), & \text{если } k>0, j \leq \binom{m-1}{k-1}, t \neq m \\ 2, & \text{если } k>0, j \leq \binom{m-1}{k}, t=m \\ \beta(m-1, k, j-(\binom{m-1}{k-1}), t), & \text{если } k>0, j > \binom{m-1}{k-1}, t \neq m \\ 1, & \text{если } k>0, j > \binom{m-1}{k-1}, t=m. \end{cases}$$

Простой индукцией по m доказывается, что, по крайней мере, для всех m, k, j, t с $0 \leq k \leq m$, $1 \leq j \leq \binom{m}{k}$, $1 \leq t \leq m$ — (2.1) дает точно одно значение $\beta(m, k, j, t)$.

Указанное выше наглядное представление функции β удовлетворяет определению (2.1) для $0 \leq k \leq m$, $1 \leq j \leq \binom{m}{k}$, $1 \leq t \leq m$.

С помощью функции β введем новую функцию γ :

$$(2.2) \quad \gamma(m, k, j, t) = \sum_{\tau=1}^t \beta(m, k, j, \tau).$$

Справедливы следующие отношения:

$$(2.3) \quad \beta(1, 0, 1, 1) = 1,$$

$$(2.4) \quad \beta(1, 1, 1, 1) = 2,$$

$$(2.5) \quad \gamma(m, k, j, m) = m+k, \quad \text{если } 0 \leq k \leq m, 1 \leq j \leq \binom{m}{k}.$$

(2.3) и (2.4) видны из (2.1). (2.5) легко проверяется для $m=1$, $k=0,1$ и для произвольного m и $k=0$. Для произвольного m и $k > 0$ (2.5) доказывается индукцией по m , причем надо выделить случаи $1 \leq j \leq \binom{m-1}{k-1}$ и $\binom{m-1}{k-1} < j \leq \binom{m}{k}$ и, соответственно, использовать вторую и третью, либо четвертую и пятую строки в (2.1).

Подробности опускаем.

В этой работе договоримся пользоваться следующими соотношениями:

$$(2.6) \quad \binom{0}{0} = 1$$

$$(2.7) \quad \binom{n}{k} = 0 \quad \text{для } k < 0,$$

$$(2.8) \quad \prod_{t=1}^p c_t = 1, \text{ если } q > p.$$

Кроме того, часто будем ставить номера используемых соотношений над знаком равенства, справедливого благодаря этим соотношениям, например,

$$\beta(1, 0, 1, 1) \stackrel{(2.1)}{=} 1.$$

3. Явное описание величин s_i

Введем сокращенную запись

$$(3.1) \quad (u, v)_q^p = \begin{cases} u_q, & \text{если } p=1 \\ v_q, & \text{если } p=2, \end{cases}$$

с помощью которой формулируем следующую теорему.

Теорема 3.1: Пусть величины $s_i (i \geq 1)$ определяются рекурсией:

$$(3.3) \quad \begin{aligned} s_1 &= 1, \\ s_2 &= u_1, \\ s_{i+1} &= u_i s_i + v_i s_{i-1}, \quad (i \geq 2), \end{aligned}$$

тогда

$$(3.4) \quad s_i = \sum_{k=0}^{\left[\frac{i-1}{2}\right]-1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k}} \prod_{t=1}^{i-k-1} (u, v)_{\gamma(i-k-1, k, j, t)}^{\beta(i-k-1, k, j, t)} \quad (i \geq 1).$$

Доказательство:

$$i=1: \quad S_1 = \prod_{t=1}^0 (u, v)_{\gamma(0, 0, 1, t)}^{\beta(0, 0, 1, t)} \stackrel{(2.6), (2.8)}{=} 1.$$

$$i=2: \quad S_2 = \prod_{t=1}^1 (u, v)_{\gamma(1, 0, 1, t)}^{\beta(1, 0, 1, t)} \stackrel{(2.3)}{=} u_1.$$

Далее мы докажем, что для $i \geq 2$ величины s_{i+1}, s_i, s_{i-1} , определенные формулой (3.4), удовлетворяют (3.3).

Используя следующую сокращенную запись:

$$(3.5) \quad P_{m,k,j} = \prod_{t=1}^m (u, v) \frac{\beta(m, k, j, t)}{\gamma(m, k, j, t)},$$

установим два равенства (3.6) и (3.10) для величин $P_{m,k,j}$.

$$(3.6) \quad u_i \cdot P_{i-k-1, k, j} = P_{i-k, k, j + (\frac{i-k-1}{k-1})}, \quad \text{если } 2 \leq i, \quad 0 \leq k \leq \left[\frac{i-1}{2}\right] - 1, \\ 1 \leq j \leq \binom{i-k-1}{k-1}.$$

Сначала докажем (3.6) для $k=0$. В этом случае $j=1$

$$u_i \cdot P_{i-1, 0, 1} = u_i \cdot \prod_{t=1}^{i-1} (u, v) \frac{\beta(i-1, 0, 1, t)}{\gamma(i-1, 0, 1, t)} \stackrel{(2.1)}{=} u_i \cdot \prod_{t=1}^{i-1} u_t = \prod_{t=1}^i u_t,$$

и также

$$P_{i-0, 0, 1+0} = \prod_{t=1}^i (u, v) \frac{\beta(i, 0, 1, t)}{\gamma(i, 0, 1, t)} = \prod_{t=1}^i u_t.$$

При $k > 0$ справедливы следующие равенства:

$$(3.7) \quad (u, v) \frac{\beta(i-k, k, j + (\frac{i-k-1}{k-1}), i-k)}{\gamma(i-k, k, j + (\frac{i-k-1}{k-1}), i-k)} \stackrel{(2.1), (2.5)}{=} u_i$$

(принимая во внимание, что $i \geq j \Rightarrow j + (\frac{i-k-1}{k-1}) > (\frac{i-k-1}{k-1})$,

$$0 \leq k \leq \left[\frac{i-1}{2}\right] - 1 \Rightarrow k \leq i-k, \quad \text{и} \\ 1 \leq j \leq \binom{i-k-1}{k-1} \Rightarrow 1 \leq j + (\frac{i-k-1}{k-1}) < \binom{i-k}{k}.$$

$$(3.8) \quad \beta(i-k, k, j + (\frac{i-k-1}{k-1}), t) \stackrel{(2.7)}{=} \beta(i-k-1, k, j, t) \quad \text{для } 1 \leq t \leq i-k,$$

и

$$(3.9) \quad \gamma(i-k, k, j + (\frac{i-k-1}{k-1}), t) = \gamma(i-k-1, k, j, t) \quad \text{для } 1 \leq t \leq i-k.$$

Теперь

$$P_{i-k, k, j + (\frac{i-k-1}{k-1})} = \left(\prod_{t=1}^{i-k-1} (u, v) \frac{\beta(i-k, k, j + (\frac{i-k-1}{k-1}), t)}{\gamma(i-k, k, j + (\frac{i-k-1}{k-1}), t)} \right) \cdot (u_i)^{(\frac{i-k-1}{k-1})} \cdot \gamma(i-k-1, k, j, i-k) = \\ (3.7), (3.8), (3.9) = u_i \cdot \prod_{t=1}^{i-k-1} (u, v) \frac{\beta(i-k-1, k, j, t)}{\gamma(i-k-1, k, j, t)} = u_i \cdot P_{i-k-1, k, j},$$

т.е. (3.6) доказано.

$$(3.10) \quad v_i \cdot p_{i-k-2, k, j} = p_{i-k-1, k+1, j}, \quad \text{если } 2 \leq i, 0 \leq k \leq \left[\frac{i}{2}\right] - 1, \\ 1 \leq j \leq \binom{i-k-2}{k}.$$

Для доказательства равенства (3.10) сначала заметим, что

$$(3.11) \quad (u, v) \begin{matrix} \beta(i-k-1, k+1, j, i-k-1) \\ \gamma(i-k-1, k+1, j, i-k-1) \end{matrix} \stackrel{(2.1), (2.5)}{=} v_i,$$

(используя $j \leq \binom{i-k-2}{k}$)

$$k \leq \left[\frac{i}{2}\right] - 1 \Rightarrow k+1 \leq i-k-1, \quad \text{и}$$

$$1 \leq j \leq \binom{i-k-2}{k} \Rightarrow 1 \leq j \leq \binom{i-k-1}{k+1},$$

$$(3.12) \quad \beta(i-k-1, k+1, j, t) \stackrel{(2.1)}{=} \beta(i-k-2, k, j, t) \quad \text{для } -1 \leq t \leq i-k-1, \quad \text{и}$$

$$(3.13) \quad \gamma(i-k-1, k+1, j, t) = \gamma(i-k-2, k, j, t) \quad \text{для } -1 \leq t \leq i-k-1.$$

Теперь

$$\begin{aligned} p_{i-k-1, k+1, j} &= \left(\prod_{t=1}^{i-k-2} (u, v) \begin{matrix} \beta(i-k-1, k+1, j, t) \\ \gamma(i-k-1, k+1, j, t) \end{matrix} \right) \cdot (u, v) \begin{matrix} \beta(i-k-1, k+1, j, i-k-1) \\ \gamma(i-k-1, k+1, j, i-k-1) \end{matrix} \\ &\stackrel{(3.11), (3.12), (3.13)}{=} v_i \cdot \prod_{t=1}^{i-k-2} (u, v) \begin{matrix} \beta(i-k-2, k, j, t) \\ \gamma(i-k-2, k, j, t) \end{matrix} = v_i \cdot p_{i-k-2, k, j}, \end{aligned}$$

т.е. (3.10) тоже доказано.

Итак, можем теперь вычислять

$$\begin{aligned} u_i \cdot S_i + v_i \cdot S_{i+1} &= \sum_{k=0}^{\left[\frac{i+1}{2}\right]-1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k}} u_i \cdot p_{i-k-1, k, j} + \sum_{k=0}^{\left[\frac{i}{2}\right]-1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-2}{k}} v_i \cdot p_{i-k-2, k, j} = \\ &\stackrel{(3.6), (3.10)}{=} \sum_{k=0}^{\left[\frac{i+1}{2}\right]-1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k}} p_{i-k, k, j + \binom{i-k-1}{k-1}} + \sum_{k=0}^{\left[\frac{i}{2}\right]-1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-2}{k}} p_{i-k-1, k+1, j} = Y. \end{aligned}$$

Выделим два случая

a) $i = 2n$ ($n \geq 1$). При этом

$$\left[\frac{i+1}{2} \right] = \left[\frac{i}{2} \right] + \left[\frac{i+1}{2} \right] - 1 = n \quad \text{и} \quad \binom{i - \left[\frac{i}{2} \right] - 1}{\left[\frac{i}{2} \right] - 1} = \binom{i - \left[\frac{i}{2} \right]}{\left[\frac{i}{2} \right]} = 1.$$

$$\begin{aligned} \text{Итак, } Y &= \sum_{k=0}^{\left[\frac{i}{2} \right] - 1} \sum_{j=1 + \binom{i-k-1}{k-1}}^{\binom{i-k-1}{k} + \binom{i-k-1}{k-1}} P_{i-k, k, j} + \sum_{k=1}^{\left[\frac{i}{2} \right]} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k-1}} P_{i-k, k, j} = \\ &= \sum_{k=1}^{\left[\frac{i}{2} \right] - 1} \left(\sum_{j=1 + \binom{i-k-1}{k-1}}^{\binom{i-k}{k}} P_{i-k, k, j} + \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k-1}} P_{i-k, k, j} \right) + \sum_{j=1+0}^{(\frac{i}{2})+0} P_{i-0, 0, j} + \sum_{j=1}^{\left(\left[\frac{i}{2} \right] - 1 \right)} P_{i - \left[\frac{i}{2} \right], \left[\frac{i}{2} \right], j} = \\ &= \sum_{k=1}^{\left[\frac{i}{2} \right] - 1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k}{k}} P_{i-k, k, j} + \sum_{j=1}^{\binom{i-0}{0}} P_{i-0, 0, j} + \sum_{j=1}^{\binom{i - \left[\frac{i}{2} \right]}{\left[\frac{i}{2} \right]}} P_{i - \left[\frac{i}{2} \right], \left[\frac{i}{2} \right], j} = \\ &= \sum_{k=0}^{\left[\frac{i}{2} \right]} \sum_{j=1}^{\binom{i-k}{k}} P_{i-k, k, j} = \sum_{k=0}^{\left[\frac{i+2}{2} \right] - 1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k+1}{k}} P_{i-k, k, j} = S_{i+1}. \end{aligned}$$

b) $i = 2n+1$ ($n \geq 1$). В этом случае $\left[\frac{i+1}{2} \right] - 1 = \left[\frac{i}{2} \right] = \left[\frac{i+2}{2} \right] - 1$,

$$\begin{aligned} Y &= \sum_{k=0}^{\left[\frac{i}{2} \right]} \sum_{j=1 + \binom{i-k-1}{k-1}}^{\binom{i-k-1}{k} + \binom{i-k-1}{k-1}} P_{i-k, k, j} + \sum_{k=1}^{\left[\frac{i}{2} \right]} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k-1}} P_{i-k, k, j} = \\ &= \sum_{k=1}^{\left[\frac{i}{2} \right]} \left(\sum_{j=1 + \binom{i-k-1}{k-1}}^{\binom{i-k}{k}} P_{i-k, k, j} + \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k-1}} P_{i-k, k, j} \right) + \sum_{j=1+0}^{(\frac{i}{2})+0} P_{i-0, 0, j} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^{\left[\frac{i}{2}\right]} \sum_{j=1}^{(i-k)} p_{i-k, k, j} + \sum_{j=1}^{\left(\frac{i}{2}\right)} p_{i-\left[\frac{i}{2}\right], j} = \sum_{k=0}^{\left[\frac{i}{2}\right]} \sum_{j=1}^{(i-k)} p_{i-k, k, j} - \\
 &= \sum_{k=0}^{\left[\frac{i+2}{2}\right]-1} \sum_{j=1}^{(i-k)} p_{i-k, k, j} - S_{i+1}.
 \end{aligned}$$

На этом теорема 3.1 доказана.

4. Примечания

Приведем два примера использования представления (3.4).

Пример 1: Числа Фибоначчи.

Числа Фибоначчи F_i ($i \geq 1$) определены рекурсией

$$(4.1) \quad F_1 = F_2 = 1$$

$$F_{i+1} = F_i + F_{i-1} \quad (\text{для } i \geq 2).$$

Подставляя $u_1 = u_2 = v_i = 1$ ($i \geq 2$) в (3.4), получаем известное выражение для i -ого числа Фибоначчи (см., например [2], стр. 13)):

$$(4.2) \quad F_i = \sum_{k=0}^{\left[\frac{i+1}{2}\right]-1} \binom{i-k-1}{k}.$$

Именно:

$$F_i = \sum_{k=0}^{\left[\frac{i+1}{2}\right]-1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k}} \prod_{t=1}^{i-k-1} 1 = \sum_{k=0}^{\left[\frac{i+1}{2}\right]-1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k}} 1 = \sum_{k=0}^{\left[\frac{i+1}{2}\right]-1} \binom{i-k-1}{k}.$$

Пример 2: Определитель трехдиагональных матриц.

Пусть

$$(4.3) \quad A = \begin{pmatrix} b_1 & c_2 & & & \\ a_2 & b_2 & c_3 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a_{i-1} & b_{i-1} & c_i \\ & & & a_i & b_i & \end{pmatrix}$$

- трехдиагональная матрица. Ее определитель обозначим через $\det_{i+1}(a_2, \dots, a_i, b_1, \dots, b_i, c_2, \dots, c_i)$. Разлагая определитель по последней строке и минор, принадлежащий a_i , по последнему столбцу, получаем:

$$(4.4) \quad \begin{aligned} \det_{i+1}(a_2, \dots, a_i, b_1, \dots, b_i, c_2, \dots, c_i) &= \\ &= b_i \det_i(a_2, \dots, a_{i-1}, b_1, \dots, b_{i-1}, c_2, \dots, c_{i-1}) - \\ &- a_i c_i \det_{i-1}(a_2, \dots, a_{i-2}, b_1, \dots, b_{i-2}, c_2, \dots, c_{i-2}). \end{aligned}$$

Знаем, что

$$(4.5) \quad \det_2(b_1) = b_1.$$

Кроме того, полагаем

$$(4.6) \quad \det_1 = 1.$$

Таким образом, (4.4), (4.5) и (4.6) дают рекурсию вида (3.3) для вычисления $\det_{i+1}(a_2, \dots, a_i, b_1, \dots, b_i, c_2, \dots, c_i)$, где теперь

$$c_i = b_i \quad (i \geq 1) \quad \text{и} \quad v_i = a_i c_i \quad (i \geq 2).$$

Формула (3.4) дает аналитическое представление для

$$\det_i(a_2, \dots, a_{i-1}, b_1, \dots, b_{i-1}, c_2, \dots, c_{i-1}):$$

$$(4.7) \quad \det_i(a_2, \dots, a_{i-1}, b_1, \dots, b_{i-1}, c_2, \dots, c_{i-1}) = \\ = \sum_{k=0}^{\left[\frac{i+1}{2}\right]-1} \sum_{j=1}^{\binom{i-k-1}{k}} \prod_{t=1}^{i-k-1} (b_{q_t})_{j(i-k-1, k, j, t)}^{B(i-k-1, k, j, t)} \quad (i \geq 1),$$

где

$$(4.8) \quad (b_{q_t})_q^r = \begin{cases} b_q & \text{если } r = 1 \\ -a_{q_t} & \text{если } r = 2. \end{cases}$$

Этими определителями можно, например, выразить элементы обратной матрицы A^{-1} (см. /I/), так что отношение (4.7) позволяет и явное представление для обратной матрицы A^{-1} .

Проблема возникла в ходе общей работы с Г.Емельяненко /I/.

В.Душский (Москва) и Г.Осоксов (Дубна) дали ценные советы.

В.Галактионов просмотрел русский текст работы. Им всем я выражают глубокую благодарность.

ЛИТЕРАТУРА

1 . Б.Бухбергер, Г.А.Емельяненко.

Препринт ОИЯИ, РII-5686, Дубна, 1971.

2 . Н.Н.Воробьев. Числа Фибоначчи. Изд. "Наука", М., 1964.

Рукопись поступила в издательский отдел
19 мая 1971 года.