2002 г. март — апрель *т. 57, вып. 2(344)*
УСПЕХИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

УДК 514.7

ИНСТАНТОНЫ И МОНОПОЛИ

Н. А. Тюрин

В настоящем обзоре представлены основные понятия и конструкции калибровочных теорий, а именно, теории Дональдсона, теории Зайберга–Виттена и связывающей их теории B-монополей. В рамках дифференциальной геометрии эти теории доставляют новые инварианты гладких структур в размерности 4. Введение таких новых калибровочных инвариантов позволило решить многие проблемы в современной геометрии. Техника, разработанная в рамках этих теорий, доставляет новые современные методы исследований как в гладкой геометрии, так и в прикладных вопросах математической физики. Не претендуя на детальную полноту, данный обзор нацелен на то, чтобы представить предмет в максимальной широте и доступности.

Библиография: 27 названий.

СОДЕРЖАНИЕ

§ 1. Введение

П. А. М. Дирак в предисловии к первому изданию книги "Принципы квантовой механики" [3] определил понятие физической величины, наблюдаемой нами, как некоторый инвариант набора преобразований. Законы поведения в некоторой системе суть законы, перестановочные со всеми преобразованиями этой системы. Общая цель физики представляется тогда как нахождение уравнений, инвариантных относительно как можно больших групп преобразований.

Такой подход близок и понятен и сердцу, и уму любого математика: в каждом разделе математики найдутся методы, связанные с нахождением и изучением инвариантов по действию соответствующих групп преобразований. Инварианты заменяют нам объекты в наших рассмотрениях, и вопросы классификации объектов разрешаются в терминах численных характеристик, остающихся неизменными под действием групп преобразований. Такие вопросы классификации, как и вопросы координатизации, указывают основной путь развития предмета.

Однако сразу встает вопрос – а какие это группы и на каких многообразиях они действуют? Не успели математики разобраться с классической теорией инвариантов действия конечномерных групп Ли, как интересы геометрии потребовали перехода к рассмотрению бесконечномерных калибровочных групп. При таком переходе далеко не все средства остаются применимыми (поэтому такой переход и обобщением-то назвать трудно), тем не менее необходимо сохранить фундаментальные методы, среди которых одним из наиболее полезных является, например, симплектическая редукция. Такая динамика использования понятий не свойственна излишне стабильной математической практике. Очень часто у специалистов в той или иной области вызывает крайнее удивление, как их "собственный", "законный метод" превосходно срабатывает во вполне далекой от этого предмета задаче, иногда в замаскированном виде.

Не так давно С. Дональдсоном [6] были предложены к рассмотрению совсем уж экзотические геометрические объекты – многообразия модулей инстантонов на четырехмерных многообразиях. Их можно использовать как пленки кобордизмов в дифференциальной топологии. В частности, такие многообразия модулей могут быть использованы для определения инвариантов подлежащего гладкого четырехмерного многообразия X. Они определяются фундаментальным классом $[\mathscr{M}]$ многообразия модулей инстантонов и классами когомологий на пространстве классов калибровочно эквивалентных неприводимых связностей $A^*/\mathscr{G}$.

Модули инстантонов доставляют инварианты подлежащего многообразия в форме статсумм и корреляторов, а это то, чем интересуются физики. Поэтому вполне предсказуема связь между квантовой теорией поля и дифференциальной геометрией, возникающая при изучении инстантонов. Простейший пример: Э. Виттен в [27] показал, что можно определить, по крайней мере формально, квантовую теорию поля, для которой статсумма вида

$$W(t) = \iint e^{-tS(A,\phi)} \mathscr{D}A\mathscr{D}\phi \tag{1.1}$$

не зависит от t и доставляет дифференциально-топологические инварианты подлежащего многообразия X. Здесь интеграл берется по пространству пар (A, ϕ), где A – связность, а ϕ – некоторое вспомогательное поле (поле Хиггса). Производя интегрирование сначала по ϕ, возможно представить $W(t)$ как интеграл по пространству связностей. При стремлении параметра t к нулю подынтегральное выражение локализуется вблизи инстантонов, и Виттен предположил, что мы снова получаем те же инварианты, т.е. полиномы Дональдсона.

Чуть позднее Виттен совместно с Н. Зайбергом при исследовании механизма трех фаз квантового вакуума в суперсимметричных теориях Янга–Миллса (конденсации, конфайнмента и фазы Хиггса) использовали неприводимые ($\phi \neq 0$) классические минимумы функционала S (см. [7], [18]). Редуцируя связности к бесследовым связностям Леви-Чивита для спинорных расслоений, они построили новые инварианты четырехмерных многообразий, тесно связанные с инвариантами Дональдсона, но зачастую гораздо более простые в вычислениях. Инварианты Зайберга–Виттена четырехмерного многообразия X определяются количеством решений системы дифференциальных уравнений для экстремалей функционала S при выборе $\mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}$-структуры на X. То есть строится отображение из классов эквивалентности $\mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}$-структур (возможных классов Черна детерминанта спинорного расслоения при отсутствии 2-кручения во вторых когомологиях подлежащего многообразия) в целые числа.

Введение этой системы, получившей название уравнения А-монополя, сразу привело к прорыву плотины нерешенных задач. Приведем два примера, ярко иллюстрирующих степень полезности и применимости уравнения А-монополя в алгебраической и симплектической геометрии.

П. Кронхеймер и Т. Мровка в [13] показали, как использование уравнения монополя легко (полное доказательство – на трех страницах, случай небывалый в современной практике) приводит к доказательству гипотезы Тома – “род алгебраической кривой в $\mathbb{CP}^2$ равен нижней границе рода любых 2-многообразий, представляющих один и тот же класс гомологий”. (Тот же минимум реализуется и для псевдоголоморфных кривых.)

Род гладкой алгебраической плоской кривой степени d равен $g = (d-1)(d-2)/2$. Отсюда не слишком неожиданной выглядит

Теорема 1.1. *Пусть Σ – ориентированное двумерное многообразие, гладко вложенное в $\mathbb{CP}^2$ так, что представляет тот же класс гомологий, что и некоторая алгебраическая кривая степени d. Тогда род Σ больше или равен $(d-1)(d-2)/2$.*

Очевидно, что, приклеивая к римановой поверхности очень маленькие ручки, мы не изменим класс когомологий поверхности, но как угодно увеличим ее род. Поэтому вопрос именно в том, каков минимальный род, реализуемый кривыми.

Другой интереснейший результат представлен К. Таубсом в [19], [20]: на гладком ориентированном компактном многообразии X симплектическая структура ω, совместимая с ориентацией, задает стягиваемый конус почти комплексных структур, эрмитово совместимых с ней. Выбрав одну, мы немедленно получаем метрику g на X и класс Черна c_1 комплексного касательного расслоения на X. Этот класс – аналог канонического класса келеровой поверхности и может быть взят в качестве $\mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}$-структуры на X. Будучи целочисленным, этот класс не зависит от выбора почти комплексной структуры, а зависит только от деформационного класса симплектический структуры. Главная теорема Таубса утверждает, что в этом случае инвариант Зайберга–Виттена для класса c_1 и метрики g равен ± 1.

Вообще необходимо заметить, что в симплектическом (как и в более специальном алгебро-геометрическом) случае уравнение монополя имеет более простой вид. Причина в том, что в этом случае спинорное расслоение раскладывается в прямую сумму линейных расслоений, одно из которых – каноническое (см. § 3).

Классы Зайберга–Виттена являются аналогами канонических классов алгебраических поверхностей, а вся (конечная) совокупность их инвариантна относительно действия группы диффеоморфизмов (если $b_2^+ > 1$) подлежащей гладкой структуры.

Краткость доказательства, предложенного Кронхеймером и Мровкой, на самом деле весьма обманчива. Чтобы полностью привести это доказательство, необходимо потребовать от читателя информированности в двух традиционно различных (несмотря на усиленную пропаганду их объединения) областях математики – PDE и дифференциальной топологии. Цель этой статьи и заключается в том, чтобы объединить эти два фронта идей для широкого круга лиц, заинтересованных в том, чтобы замечательные результаты – подобные гипотезе Тома – доказывались в три страницы и открывали возможность дальнейших исследований.

Сила результатов теории Дональдсона спровоцировала желание эту теорию "упростить". Это приводит к терминологическим недоразумениям. Например, частный случай монополей, используемых в дифференциальной геометрии, называются абелевыми монополями. Это недоразумение. Связности в спинорных монополях, конечно, неабелевы. Только бесследовая часть этих связностей фиксирована и равна бесследовой части связности Леви-Чивита, так что свободной переменной остается только диагональная часть, т.е. абелева связность.

Конечно, при исходном физическом подходе подобные недоразумения исключены в силу самого физического смысла уравнений. Поэтому в процессе нашего описания теории мы обязаны обращаться к физическим истокам и в историческом и в идейном аспектах. А широко используемые ныне в дифференциальной топологии монополи будем называть A-монополями.

С другой стороны, неабелевы монополи позволяют наглядно, геометрически соединить инварианты Дональдсона с инвариантами Зайберга–Виттена. Эта конструкция (см. [16]) абсолютно аналогична конструкции пленки кобордизма между 4-многообразием с определенной формой пересечения и несвязным объединением комплексных проективных поверхностей (см. ниже), которой Дональдсон открыл новейший этап четырехмерной дифференциальной топологии.

Вложение многообразия модулей инстантонов в многообразие модулей монополей можно использовать также и для доказательства существования решений наших сложных PDE (абсолютно параллельно тому, как это мы делаем для bubbling-инстантонов). Дополнительная сложность – задача описания, как себя ведут решения уравнения неабелева монополя при приближении к инстантонам. Пределами решений уравнения монополя при стремлении спинорной части к нулю могут быть только инстантоны подскока, т.е. такие asd-связности, которые допускают существование гармонического спинора, и каждый инстантон подскока реализуется как предел монополей (см. § 4). Заметим, что последнее утверждение отвечает еще и на вопрос о существовании самих B-монополей.

Для алгебраического геометра эти конструкции вполне привычны: подмногообразие инстантонов подскока в многообразии модулей инстантонов – прямой аналог первого члена фильтрации Брилля–Нётера якобиана кривой (см. [15]).

Замечательно, что, как и в классической теории Брилля–Нётера, в гладкой части многообразия модулей классы когомологий локусов Брилля–Нётера представляются классами Черна индексного расслоения оператора Дирака.

Геометрическое представление этих классов Черна продолжается и на особенности многообразия модулей. Сравнение классов этих продолжений и классов индексного расслоения эквивалентно задаче выражения классов Зайберга–Виттена через классы Дональдсона.

В тексте мы приводим все определения и конструкции калибровочной дифференциальной геометрии, поэтому многие ссылки на литературу преднамеренно опущены: мы вынуждены пренебречь многообразием литературы по данным темам (особенно по инстантонам), поскольку это затруднило бы для читателя первое ознакомление с этими новыми предметами, а, с другой стороны, наличие недоразумений, аналогичных упоминаемой абелевости монополей Зайберга–Виттена, вынудило бы нас параллельно процитировать и все физические тексты по этой теме. При этом мы сразу даем ссылку на основные источники для каждого параграфа, чтобы не испещрять текст в конце каждого абзаца или после каждой формулы. Выход один – сделать текст как можно более самозамкнутым. Для материала § § 2 и 3 (инварианты Дональдсона) необходимы источники [2] и [6], а для материала § 4 (инварианты Зайберга–Виттена) – [13] и [26]. С § 5 дело обстоит проще: как справочный материал достаточно использовать [16] и [24].

Наконец в § 6 (Добавлении) мы от калибровочных теорий возвращаемся к классической топологии, следуя (насколько это возможно) красивым конструкциям Р. Финташела и Р. Стерна [9].

В заключение введения пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность Сергею Петровичу Новикову и Виктору Матвеевичу Бухштаберу за помощь в подготовке и публикации настоящего обзора.

§ 2. Классическая теория Дональдсона

2.1. Разложение $\Lambda^2(T^*X)$. Как обычно в теории Дональдсона, мы будем рассматривать (X,g) – четырехмерное односвязное компактное ориентируемое риманово многообразие. Центральное место в теории занимает разложение пространства 2-форм по действию оператора Ходжа $*$.

Оператор определяется как композиция естественной метрики на формах и внешнего произведения:

$$\alpha\wedge *\beta=(\alpha,\beta)\,d\mu, \tag{2.1}$$

где $d\mu$ – элемент объема. На четырехмерном многообразии $*$ отображает 2-формы в 2-формы, и очевидным образом $**=\mathrm{id}_{\Lambda^2}$. Пространства автодуальных и антиавтодуальных форм (обозначаемые как Ω^+ и Ω^- соответственно), определяемые как собственные подпространства с собственными значениями ± 1 оператора $*$, являются сечениями расслоений Λ^+ и Λ^-:

$$\Lambda^2=\Lambda^+\oplus\Lambda^-,\qquad \alpha\wedge\alpha=\pm|\alpha|^2\,d\mu\to\alpha\in\Gamma(\Lambda^\pm). \tag{2.2}$$

На 4-многообразии такое разложение зависит только от конформного класса метрики.

На пространствах сечений Ω^p имеется кроме обычного дифференциала d формально сопряженный d^*, определяемый как:

$$d^*\colon \Omega^p \to \Omega^{p-1}, \qquad \int (d\alpha, \beta)\, d\mu = \int (\alpha, d^*\beta)\, d\mu, \tag{2.3}$$

т.е. в ориентируемом случае $d^* = \pm * d *$.

Теорема Ходжа утверждает, что каждый класс действительных когомологий представляется единственным образом гармонической формой α такой, что

$$d\alpha = d^*\alpha = 0. \tag{2.4}$$

Гармоничность формы сохраняется под действием оператора $*$, поэтому задание метрики определяет разложение

$$H^2(X, \mathbb{R}) = H^+ \oplus H^- \tag{2.5}$$

на автодуальные и антиавтодуальные гармонические формы. Это следует из того, что они являются максимальными положительным и отрицательным подпространствами для формы пересечения, рассматриваемой как внешнее произведение на классах де Рама. Поэтому

$$\dim H^+ = b^+, \qquad \dim H^- = b^-, \tag{2.6}$$

где (b^+, b_-) – сигнатура формы пересечения на X. То же можно получить и из построения половины комплекса де Рама. А именно, определим оператор d^+ как композицию, действующую из пространства 1-форм в Ω^+, обычного внешнего дифференцирования и алгебраической проекции $(1/2)(1 + *)$. Получаем комплекс

$$\Omega^0 \xrightarrow{\ d\ } \Omega^1 \xrightarrow{\ d^+\ } \Omega^+, \tag{2.7}$$

который есть, грубо говоря, половинка обычного комплекса. Если X компактно, тогда когомологии этого комплекса естественно отождествляются с $H^0(X, \mathbb{R})$, $H^1(X, \mathbb{R})$ и H^+.

2.2. Связности и кривизны. Напомним, что главным G-расслоением P над гладким многообразием X называется многообразие с заданным гладким правым действием группы G таким, что пространство орбит есть подлежащее X.

Можно предложить три определения связности на главных расслоениях, а именно:

а) как поле горизонтальных подпространств $H \subset TP$, трансверсальных к слою проекции $\pi\colon P \to X$;

б) как 1-форму A на P со значениями в алгебре Ли группы, инвариантную по действию G, ограничение которой на каждый слой совпадает с канонической правоинвариантной формой;

в) для любого представления G мы получаем векторное расслоение E над подлежащим многообразием, и связность может быть определена через ковариантную производную на E, т.е. линейное отображение

$$\nabla\colon \Omega^0(E) \to \Omega^1(E), \tag{2.8}$$

где $\Omega^p(E)$ – пространство векторнозначных p-форм, или сечения расслоения $\Lambda^p T^*X \otimes E$; отображение ∇ должно удовлетворять правилу Лейбница

$$\nabla(f \cdot s) = f \cdot \nabla s + df \cdot s \tag{2.9}$$

для любого сечения расслоения E и функции f.

Кроме того, если на E заданы дополнительные структуры, связность должна быть с ними согласована. Например, при задании метрики связность должна удовлетворять условию:

$$d(s,t) = (\nabla s, t) + (s, \nabla t) \tag{2.10}$$

(введение дополнительных структур соответствует тому, что группа становится меньше (редуцируется к подгруппе), например, эрмитова метрика предполагает, что группа не полная линейная, а унитарная).

Все три определения связности суть одно и то же.

Обычно используется третье определение, но всегда полезно видеть за ним и все три. Тогда, например, очевидно, что связность на расслоении E есть одновременно и связность на $\operatorname{ad} E$. Действительно, связность на векторном расслоении есть и связность на главном расслоении с группой $\operatorname{Aut} E$ и той же базой. Но мы можем рассмотреть два разных представления этого главного расслоения - стандартное и присоединенное. В первом случае мы снова получим E, во втором $\operatorname{ad} E$, оба векторных расслоения снабжены связностью, которая есть одна и та же связность.

Из общих свойств связностей хотелось бы указать следующие:

а) на тривиальном расслоении $\mathbb{C}^n = \mathbb{C}^n \times X$ есть выделенная связность – стандартная, ковариантное дифференцирование, задаваемое ею, есть просто дифференцирование векторнозначных функций;

б) связность – объект ковариантный;

в) связность определяет параллельный перенос слоев вдоль пути на подлежащем многообразии;

г) разность двух связностей есть 1-форма; пусть a – некоторая связность на E, а ω – элемент пространства $\Omega^1(\operatorname{ad} E)$; тогда определена новая эрмитова связность $a + \omega$, причем ω действует алгебраически на сечениях расслоения посредством очевидного спаривания

$$\Omega^0(E) \times \Omega^1(\operatorname{End} E) \to \Omega^1(E), \tag{2.11}$$

а ограничение на $\operatorname{ad} E \subset \operatorname{End} E$ соответствует тому, что новая связность согласована со структурной группой E.

Таким образом, пространство эрмитовых связностей $\mathscr{A}$ есть аффинное пространство над векторным $\Omega^1(\operatorname{ad} E)$.

Введем внешнюю производную на пространствах $\Omega^p(E)$,

$$d_a \colon \Omega^p(E) \to \Omega^{p+1}(E), \tag{2.12}$$

отображающую $\Omega^p(E)$ в $\Omega^{p+1}(E)$ по правилам

$$\begin{gathered} d_a = \nabla_a \quad \text{на} \quad \Omega^0(E), \\ d_a(\omega \wedge \eta) = (d\omega) \wedge \eta + (-1)^p \omega \wedge d_a \eta, \end{gathered} \tag{2.13}$$

если $\omega \in \Omega^p$ и $\eta \in \Omega^q(E)$. Заметим сразу, что такое же внешнее дифференцирование аналогичным образом вводится и на пространствах $\Omega^p(\operatorname{ad} E)$, причем эти два оператора действуют согласованно.

Оператор d_a очень похож на обычное внешнее дифференцирование, но комплекса, подобного комплексу де Рама, с его помощью определить не удастся. Препятствием к этому является кривизна связности a.

Кривизна есть последовательное применение оператора d_a дважды, а именно, $F_a = d_a d_a$. Проверкой правила Лейбница устанавливается, что кривизна есть оператор алгебраический, $F_a \in \Omega^2(\operatorname{ad} E)$.

Нетрудно вывести формулу для кривизны возмущенной связности:

$$F_{a+\omega} = F_a + d_a(\omega) + \omega \wedge \omega, \tag{2.14}$$

где последнее выражение обозначает композицию внешнего произведения и естественного умножения в $\operatorname{ad} E \subset \operatorname{End} E$.

Тождество Бианки утверждает для любой связности равенство

$$d_a(F_a) = 0. \tag{2.15}$$

Пользуясь метрикой, можно ввести оператор, формально сопряженный оператору внешнего дифференцирования:

$$d_a^* \colon \Omega^p(E) \to \Omega^{p-1}(E), \tag{2.16}$$

определяемый равенством

$$\int_X (d_a \phi, \psi)\, d\mu = \int_X (\phi, d_a^* \psi)\, d\mu \tag{2.17}$$

для любых форм подходящего порядка.

Разложение (2.2) очевидным образом продолжается и на пространство

$$\Omega^2(\operatorname{ad} E) = \Omega^+(\operatorname{ad} E) \oplus \Omega^-(\operatorname{ad} E), \tag{2.18}$$

поэтому мы имеем

$$F_a = F_a^+ + F_a^-, \qquad F_a^\pm \in \Omega^\pm(\operatorname{ad} E). \tag{2.19}$$

Связность a называется автодуальной, если $F_a^- = 0$, и антиавтодуальной, если $F_a^+ = 0$.

Напомним еще раз, что разложение (2.2) конформно инвариантно, значит, и условия автодуальности и антиавтодуальности обладают таким же свойством.

2.3. Функционал Янга–Миллса. Напомним, что согласно теории Черна–Вейля для любого комплексного расслоения E и произвольной связности a на его сечениях первый класс Черна $c_1(E)$ представляется замкнутой формой $\frac{i}{2}\pi \operatorname{Tr}(F_a)$. След квадрата кривизны при этом выражается следующим образом:

$$\left[\frac{1}{4\pi^2} \operatorname{Tr}(F_a^2)\right] = 2c_2(E) - c_1^2(E) \in H^4(X). \tag{2.20}$$

Для четырехмерных многообразий – односвязных, ориентируемых, компактных – которые обычно и рассматриваются в теории Дональдсона, и для SU(2)-связностей имеем в качестве следствия предыдущей формулы

$$c_2(E) = \frac{1}{8\pi^2}\int_X \mathrm{Tr}(F_a^2) \in \mathbb{Z}. \tag{2.21}$$

Разберем условие антиавтодуальности. Заметим, что в алгебре кососимметрических матриц $\mathrm{Tr}(\omega^2) = -|\omega|^2$. Вместе с определением разложения 2-форм это дает

$$\mathrm{Tr}(F_a^2) = -(|F_a^+|^2 + |F_a^-|^2)\,d\mu, \tag{2.22}$$

а значит, после интегрирования по компактной базе получаем

$$8\pi^2 c_2(E) = \int_X |F_a^-|^2\,d\mu - \int_X |F_a^+|^2\,d\mu. \tag{2.23}$$

Таким образом, абсолютное значение c_2 задает нижнюю границу значений функционала Янга–Миллса, вид которого очень прост – квадрат L^2-нормы кривизны равен

$$\|F_a\|^2 = \int_X |F_a|^2\,d\mu = \int_X |F_a^-|^2\,d\mu + \int_X |F_a^+|^2\,d\mu. \tag{2.24}$$

Если c_2 положителен, то очевидным образом критерием антиавтодуальности будет условие $\|F_a\|^2 = 8\pi^2 c_2(E)$.

Уравнение Эйлера–Лагранжа для функционала $\|F_a\|^2$ на пространстве связностей, называемое уравнением Янга–Миллса, имеет вид

$$d_a^* F_a = 0. \tag{2.25}$$

Эта удивительная простота теории Янга–Миллса невольно наводит на мысль об универсальной применимости ее во многих областях. Но еще более поразителен тот факт, что в четырехмерном случае функционал конформно инвариантен. Действительно, в случае размерности d умножение метрики на c дает в 2-формах множитель c^{-2}, в то же время элемент объема изменяется в c^d раз. Поэтому интеграл $\int_X |F_a|^2\,d\mu$ преобразуется к виду $\int_X c^{4-d}|F_a|^2\,d\mu$ и остается неизменным, в точности когда $d = 4$.

Обратим внимание на то, что нижняя граница значения функционала задается в случае SU(2)-связности только вторым классом Черна. Это следствие того, что первый класс Черна SU(2)-расслоения равен нулю.

Одновременно для унитарных и ортогональных связностей введем характеристическое число $k(E)$, которое:

а) для $\mathrm{SU}(r)$-расслоений равно, как и выше, $k(E) = c_2(E)$;
б) для $\mathrm{U}(r)$-расслоений равно $k(E) = c_2(E) - \frac{1}{2}c_1^2(E)$;
в) для $\mathrm{SO}(r)$-расслоений (вещественных) равно $k(V) = -\frac{1}{4}p_1(V)$.

Напомним, что первый класс Понтрягина $p_1(V)$ определяется формулой $p_1(V) = c_2(V \otimes \mathbb{C}) \in H^4(X, \mathbb{Z})$.

После всего сказанного становится очевидным, что если расслоение E над X допускает антиавтодуальные связности, то $k(E) \geqslant 0$, а если $k(E) = 0$, то все антиавтодуальные связности плоские.

2.4. Многообразие модулей инстантонов. Построение многообразия модулей инстантонов разбивается на два шага: первый заключается в решении уравнения антиавтодуальности (которое мы будем для краткости так и называть – уравнение инстантона), второй – в разбиении пространства решений (бесконечномерного) на орбиты по действию группы калибровочных преобразований, факторизации по действию группы, в результате чего получается конечномерное гладкое для общей метрики многообразие, которое возможно компактифицировать.

Факторизация по действию группы необходима – с бесконечномерным пространством решений трудно связать какие-либо объекты, имеющие математический смысл. Заметим, однако, что физики для получения статсумм вида (1.1) смело интегрируют по всем связностям: метод перевала приводит к рассмотрению только малых окрестностей экстремалей функционала Янга–Миллса, в частности – абсолютных минимумов, т.е. инстантонов.

Для построения классов эквивалентности на пространстве связностей необходимо (и обычно применяется) пополнение по соболевским нормам. Для этого фиксируется некоторое $l \geqslant 2$ и сечения расслоения пополняются по норме L^2_l. Тогда связности наделяются L^2_{l-1}-нормой, а кривизны – L^2_{l-2}-нормой.

Группа калибровочных преобразований $\mathscr{G}$ (или, как мы будем иногда, допуская математическую неряшливость языка, говорить – калибровочная группа) есть просто группа L^2_l-автоморфизмов расслоения E.

Определим факторпространство

$$\mathscr{B} = \mathscr{A}/\mathscr{G}. \tag{2.26}$$

Очевидно, что метрика на пространстве связностей, определяемая как

$$\|a-b\| = \left(\int_X |a-b|^2\, d\mu\right)^{1/2} \tag{2.27}$$

(тождественная метрике на пространстве 1-форм со значениями в $\operatorname{ad} E$), сохраняется при действии калибровочной группы одновременно на обе связности, поэтому для более точного отражения топологической структуры на $\mathscr{B}$ необходимо ввести расстояние между классами связностей.

Если $[a]$ и $[b]$ – орбиты связностей, тогда определим расстояние как

$$\tau([a],[b]) = \inf \|a-u(b)\|, \qquad u \in \mathscr{G}. \tag{2.28}$$

И, естественно, это индуцирует τ – метрику на факторпространстве $\mathscr{B}$.

Для описания окрестности класса $[a]$ в факторпространстве $\mathscr{B}$ воспользуемся следующей конструкцией. Пусть

$$T_{a,\varepsilon} = \{\omega \in \Omega^1(\operatorname{ad} E) \mid d_a^*(\omega) = 0,\ \|\omega\| < \varepsilon\}, \tag{2.29}$$

где, договоримся, под нормами будем понимать соболевские нормы тех индексов, которые мы присвоили пространствам в начале п. 2.4. Тогда окрестность орбиты, представляемой связностью a, может быть описана как некоторая факторизация $T_{a,\varepsilon}$ при достаточно малом ε.

Заметим, что условие $d_a^*(\omega) = 0$ в определении (2.29) очень просто истолковывается. Действительно, если форма ω точна, т.е. представляется в виде $d_a\lambda$, где λ – просто функция со значениями в эндоморфизмах, то нетрудно видеть, что $\tau([a+\omega],[a]) = 0$.

Условие $d_a^*(\omega) = 0$ означает, что связности $a+\omega$ и a находятся в кулоновской калибровке.

Чтобы объяснить, как факторизуется $T_{a,\varepsilon}$, введем для каждой связности подгруппу калибровочных преобразований

$$\Gamma_a = \{u \in \mathscr{G} \mid u(a) = a\}. \tag{2.30}$$

Как замкнутая подгруппа калибровочной группы Γ_a является группой Ли. Ее алгебра Ли определяется просто как ядро $\ker d_a \subset \Omega^0(\operatorname{ad} E)$. Очевидно, группа Γ_a действует на $\Omega^1(\operatorname{ad} E)$ и, следовательно, на $T_{a,\varepsilon}$.

Оказывается, что для достаточно малых ε проекция $\pi\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$ индуцирует гомеоморфизм между фактором $T_{a,\varepsilon}/\Gamma_a$ и окрестностью орбиты $[a]$.

Группы Γ_a классифицируют связности в следующем смысле. Если такая подгруппа минимальна – а это значит, что она в каждой точке совпадает с централизатором структурной группы расслоения, то мы будем называть соответствующую связность неприводимой.

Открытое подмножество неприводимых связностей мы будем обозначать $\mathscr{A}^* \subset \mathscr{A}$. Тогда фактор неприводимых связностей по действию калибровочной группы $\mathscr{B}^* \subset \mathscr{B}$ локально изображается шарами $T_{a,\varepsilon}$ в гильбертовых пространствах $\ker d_a^* \subset L^2_{l-1}(\Omega^1(\operatorname{ad} E))$. Это задает покрытие $\mathscr{B}^*$ картами, превращающее это факторпространство в гладкое гильбертово многообразие неприводимых связностей.

Термин “приводимость” используется обычно в том смысле, что связность раскладывается в прямую сумму пары связностей, действующих на паре расслоений, прямая сумма которых составляет исходное расслоение. Это далеко не всегда равносильно тому, что изотропная подгруппа Γ_a связности a минимальна. Но в условиях наших рассмотрений ($\mathrm{SU}(2)$-, $\mathrm{U}(2)$-, $\mathrm{SO}(3)$-расслоение над односвязным многообразием) два эти условия совпадают.

В случае комплексного $\mathrm{SU}(2)$-расслоения приводимость соответствует разложению $E = L \oplus L^{-1}$, при этом $\operatorname{ad} E = \mathbb{R} \oplus L^{\otimes 2}$. В случае вещественного – разложение имеет вид $\operatorname{ad} E = \mathbb{R} \oplus L$.

Как уже отмечалось, приводимые связности составляют особенности гильбертова многообразия $\mathscr{B}$. Самой особой является самая простая – тривиальная – связность. Состоящая из трех различных компонент, она представляется конусом над пространством, которое и само является особым.

Необходимо также добавить, что для $\mathrm{SU}(2)$- или $\mathrm{SO}(3)$-связности калибровочно эквивалентные классы приводимых антиавтодуальных связностей в точности соответствуют парам $\pm c$, где c – ненулевые классы в $H^2(X,\mathbb{Z})$, причем $c^2 = -c_2(E)$ или $p_1(E)$ соответственно, но это верно, подчеркнем, только в односвязном случае.

Очевидно, что условие антиавтодуальности инвариантно при действии калибровочной группы. Это следует из инвариантности функционала Янга–Миллса, экстремалями которого являются эти связности. Поэтому на пространстве модулей $\mathscr{B}$ определяется подмножество $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}$ – орбиты антиавтодуальных связностей по модулю действия калибровочной группы. A priori такие множества должны обозначаться как $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(l)$, в зависимости от индекса соболевских норм. Однако естественное вложение

$\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(l+1)$ в $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(l)$ оказывается гомеоморфизмом. Поэтому в дальнейшем индексы будут опускаться, за исключением тех случаев, когда это может привести к недоразумению.

$\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}$ называется многообразием модулей антиавтодуальных связностей или – короче – инстантонов.

Локально $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}$ может быть описано так же, как и $\mathscr{B}$. Пусть a – антиавтодуальная связность. Тогда определим отображение ψ таким образом:

$$\begin{gathered}\psi\colon T_{a,\varepsilon} \to \Omega^+(\operatorname{ad} E),\\ \psi(\omega) = F^+(a+\omega) = d_a^+(\omega) + (\omega\wedge\omega)^+.\end{gathered} \tag{2.31}$$

Как и выше, фактор схемы нулей этого отображения по изотропной подгруппе $Z(\psi)/\Gamma_a$ гомеоморфен окрестности $[a]$ в $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}$.

Заметим, что отображение ψ – гладкое фредгольмово, дифференциал которого в нуле есть просто

$$d_a^+\colon \ker d_a^* \to \Omega^+(\operatorname{ad} E). \tag{2.32}$$

Это следует из эллиптичности (и, значит, фредгольмовости) оператора $\delta_a = d_a^* \oplus d_a$, поскольку ограничение оператора в (2.32) совпадает с δ_a. Размерность многообразия модулей инстантонов совпадает с индексом оператора δ_a. Обозначим $s = \operatorname{ind}\delta_a$. Это число находится по теореме Атьи–Зингера и зависит только от топологических параметров подлежащего многообразия и расслоения E. А именно, для $\mathrm{SU}(2)$-расслоения получаем

$$s = 8c_2(E) - 3\bigl(1 - b_1(X) + b_2^+(X)\bigr), \tag{2.33}$$

а для $\mathrm{SO}(3)$-расслоения

$$s = -2p_1(E) - 3\bigl(1 - b_1(X) + b_2^+(X)\bigr). \tag{2.34}$$

В локальном описании уравнения $d_a^*(\omega) = 0$ и $d_a^+(\omega) + (\omega\wedge\omega)^+ = 0$ играют разную роль. Второе есть собственно уравнение антиавтодуальности, первое же описывает локально срез (в кулоновской калибровке) на пространстве орбит в некоторой окрестности связности a. Такой срез может быть выбран и другими способами, поэтому правильнее представлять себе линеаризацию объекта следующим образом.

Рассмотрим деформационный комплекс

$$\Omega^0(\operatorname{ad} E) \xrightarrow{d_a} \Omega^1(\operatorname{ad} E) \xrightarrow{d_a^+} \Omega^+(\operatorname{ad} E). \tag{2.35}$$

Условие антиавтодуальности равносильно тому, что это действительно комплекс, определяющий группы когомологий H_a^0, H_a^1, H_a^2. Средние когомологии представляют линеаризацию уравнений инстантона по модулю действия калибровочной группы

$$H_a^1 = \ker d_a^+ / \operatorname{im} d_a, \tag{2.36}$$

и теория Ходжа доставляет нам естественное отождествление

$$H_a^1 \cong \ker\delta_a, \qquad H_a^2 = \operatorname{coker} d_a^+ \cong \ker d_a \subset \Omega^+(\operatorname{ad} E). \tag{2.37}$$

4 УМН, т. 57, вып. 2

В терминах этого комплекса число s есть просто эйлерова характеристика, взятая с обратным знаком:
$$s = \dim H_a^1 - \dim H_a^0 + \dim H_a^2. \tag{2.38}$$

Локальной моделью $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}$ будет фактор $f^{-1}(0)/\Gamma_a$, где
$$f\colon H_a^1 \to H_a^2 \tag{2.39}$$
– эквивариантное относительно изотропной подгруппы отображение. Функция f может быть выбрана вещественной аналитической, следовательно, многообразие модулей инстантонов – вещественно аналитическое. Обычно такая функция называется отображением Кураниши.

В случае неопределенной формы пересечения (см. ниже) и общей метрики многообразие модулей не содержит приводимых связностей; для неприводимых связностей по теореме, доказанной К. Уленбек, вторые когомологии деформационного комплекса (2.35) равны нулю. Заметим, что и для случая, когда общие метрики допускают приводимые антиавтодуальные связности (т.е. когда форма пересечений 2-циклов определена), все равно $H_a^2 = 0$. Поэтому в любом случае (для общей метрики) многообразие модулей инстантонов гладкое или гладкое почти всюду, кроме конечного числа точек, линки которых гомеоморфны проективным пространствам.

Наконец, чтобы использовать многообразия модулей как геометрические объекты (например, пленки бордизмов), необходимо еще одно важное свойство многообразия модулей инстантонов – ориентируемость.

2.5. Ориентация. Рассмотрим сначала случай $\mathrm{SU}(2)$-расслоения. Возьмем на многообразии модулей $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}$ открытое подмножество $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}^s$ классов неприводимых связностей $[a]$. Из неприводимости следует, что $H_a^2 = 0$. Тогда $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}^s$ – ориентируемо. Действительно, как было указано выше, касательное пространство к многообразию модулей в гладкой точке описывается как ядро эллиптического оператора
$$\delta_a\colon \Omega^1(\mathrm{ad}\,E) \to \Omega^0(\mathrm{ad}\,E) \oplus \Omega^+(\mathrm{ad}\,E). \tag{2.40}$$
Ориентируемость $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}^s$ эквивалентна тривиальности старшей внешней степени касательного расслоения, поэтому необходимо рассмотреть вещественное линейное расслоение $\Lambda^{\max}(\ker \delta_a)$ на $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}^s$. Так как коядро $\operatorname{coker}\delta_a$ тривиально на $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}^s$, последнее расслоение отождествляется с детерминантом индексного расслоения оператора δ_a, которое представляет собой разность ядра и коядра в K-функторе. Последнее естественно продолжается на все $\mathscr{B}^*$ как детерминант δ, подкрученный на семейство $\mathrm{SO}(3)$-связностей, приходящих с $\mathrm{ad}\,E$,
$$\Lambda = \det \operatorname{ind}(\delta, \mathrm{ad}\,E). \tag{2.41}$$

Известно, что расслоение Λ тривиально, поэтому и существует ориентация на $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}^s$.

Ориентируемость многообразия модулей имеет место не только для случая $G = \mathrm{SU}(2)$. Утверждение верно и для $\mathrm{SU}(n)$-связностей, а через них, при помощи некоторого трюка, и для $\mathrm{U}(n)$-связностей. Трюк не слишком сложен – вместо $\mathrm{U}(n)$-расслоения рассматривается $\mathrm{SU}(n+n)$-расслоение $E_+ = E \oplus E^*$, соответствующее гомоморфизму $\rho\colon \mathrm{U}(l) \to \mathrm{SU}(l+l)$, определяемому формулой

$$\rho(u) = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^{-1} \end{pmatrix}. \tag{2.42}$$

Рассмотрим теперь $\mathrm{SO}(3)$-расслоение $P \to X$. Так как X – односвязно, существует целочисленный класс $\alpha \in H^2(X,\mathbb{Z})$, $\alpha = w_2(P) \pmod 2$, такой, что P поднимается до $\mathrm{U}(2)$-расслоения $E \to X$, причем $c_1(E) = \alpha$. Далее, пусть $t\colon \mathscr{B}_{f,E} \to \mathscr{B}_{f,P}$ – отображение, порождаемое гомоморфизмом $\mathrm{U}(2) \to \mathrm{SO}(3)$, и Λ^f_E, Λ^f_P – расслоения ориентаций. Так как слои t связны, то Λ^f_P тривиально, если таковым является $t^*(\Lambda^f_P)$. С другой стороны, последнее расслоение изоморфно Λ^f_E (это связано с отождествлением $\operatorname{ad} E = \operatorname{ad} P \oplus \mathbb{R}$). Поэтому случай $\mathrm{SO}(3)$ сводится к $\mathrm{U}(2)$-случаю.

Таким образом, имеется результат: в случае общей метрики многообразие модулей неприводимых инстантонов не только гладкое, но и ориентируемое.

С другой стороны, многообразие модулей оснащенных инстантонов может быть получено как результат симплектической редукции. А именно, на пространстве связностей $\mathscr{A}$ имеется естественная симплектическая структура, задаваемая на касательных векторах $u, v \in T\mathscr{A} = \Omega^1(\operatorname{ad} E)$ как композиция свертки на $\operatorname{ad} E$ и стандартной симплектической структуры на кокасательном расслоении T^*X. Отображение моментов μ задается просто взятием положительной части кривизны (очевидно, такое отображение эквивариантно по действию калибровочной группы) и $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}} = \mu^{-1}(0)$.

§ 3. Компактификация многообразия модулей

3.1. Идеальные связности. Для нахождения численных инвариантов, связанных с многообразиями модулей инстантонов, необходимо это многообразие компактифицировать. Похожая ситуация возникает при вычислении классов Черна на некомпактном многообразии. А именно, численный результат существенно зависит от компактификации.

Компактификация по Уленбек предполагает определение класса идеальных связностей. Для простоты будем рассматривать случай $\mathrm{SU}(2)$-расслоений. Тогда для ориентированного компактного односвязного риманова четырехмерного многообразия имеется последовательность многообразий модулей $\mathscr{M}_k$, занумерованных вторыми классами Черна $k \geqslant 0$ ($\mathscr{M}_0$ – просто точка, представляющая тривиальную связность).

Идеальная антиавтодуальная связность класса k определяется как пара

$$([a], (x_1, \dots, x_l)), \tag{3.1}$$

где $[a] \in \mathscr{M}_{k-l}$ и $(x_1, \dots, x_l)$ – неупорядоченная l-ка точек подлежащего многообразия X. Плотность кривизны связности $([a], (x_1, \dots, x_l))$ определяется как

$$|F(a)|^2 + 8\pi^2 \sum_{r=1}^{l} \delta_{x_r}. \tag{3.2}$$

Пусть a_j – последовательность связностей на $\mathrm{SU}(2)$-расслоении E_k, второй класс Черна которого равен k. Назовем последовательность классов калибровочно эквивалентных связностей $[a_j]$ слабо сходящейся к предельной идеальной связности 4* $([a],(x_1,\dots,x_l))$, если выполнены следующие условия:

а) для любой непрерывной на X функции f последовательность значений интегралов $\int_X f|F(a_j)|^2\,d\mu$ сходится:

$$\int_X f\,|F(a_j)|^2\,d\mu \to \int_X f\,|F(a)|^2\,d\mu + 8\pi^2\sum_{r=1}^{l} f(x_r); \tag{3.3}$$

б) существуют отображения расслоений

$$\rho_j\colon E_l\big|_{X/(x_1,\dots,x_l)} \to E_k\big|_{X/(x_1,\dots,x_l)}, \tag{3.4}$$

так что последовательность связностей $\rho_j^*(a_j)$ сходится к a.

Для каждого k таким образом определяется топология на множестве всех идеальных связностей

$$I\mathscr{M}_k = \mathscr{M}_k \cup (\mathscr{M}_{k-1}\times X)\cup(\mathscr{M}_{k-2}\times S^2(X))\cup\cdots. \tag{3.5}$$

Многообразие модулей $\mathscr{M}_k$ вложено в $I\mathscr{M}_k$ как открытое подмножество. Определим тогда $\overline{\mathscr{M}_k}$ как замыкание $\mathscr{M}_k$ в пространстве всех идеальных связностей $I\mathscr{M}_k$.

Справедливо утверждение о том, что любая бесконечная последовательность связностей в $\mathscr{M}_k$ имеет слабо сходящуюся подпоследовательность, предел которой содержится в $\overline{\mathscr{M}_k}$. Следовательно, $\overline{\mathscr{M}_k}$ компактно.

Аналогично и для $\mathrm{SO}(3)$-расслоения при фиксированном классе Штиффеля–Уитни $w \in H^2(X,\mathbb{Z}_2)$ имеется многообразие модулей $\mathscr{M}_{k,w}$ связностей на расслоении E, причем $k(E) = -\frac{1}{4}p_1(E)$, как было определено в п. в) (раздел 2.3). Индекс k на этот раз не обязательно целое число, но разность любых двух индексов обязательно целая. Естественная компактификация в этом случае получается как замыкание $\mathscr{M}_{k,w}$ в

$$\mathscr{M}_{k,w}\cup(\mathscr{M}_{k-1,w}\times X)\cup(\mathscr{M}_{k-2,w}\times S^2(X))\cup\cdots. \tag{3.6}$$

Несмотря на ясный и четкий характер построений, при компактификации могут возникнуть весьма особые точки и локусы. Например, последовательность неприводимых связностей может сходиться к идеальной связности, локально свободная часть которой приводима, и т. д.

3.2. Чудеса начинаются. Всюду далее мы будем рассматривать только односвязные 4-многообразия. В этом случае гомотопический тип многообразия X задается целочисленной квадратичной формой пересечения q_X на $H^2(X,\mathbb{Z})$: пусть $\alpha^* \in H_2(X,\mathbb{Z})$ – двойственный к $\alpha \in H^2(X,\mathbb{Z})$ по Пуанкаре цикл, тогда

$$q_X(\alpha,\beta)=\beta(\alpha^*). \tag{3.7}$$

Заметим, что в этом односвязном случае видна четкая параллель со случаем двумерной связной компактной римановой поверхности Σ: гомотопический тип Σ задается симметрической формой q_Σ на $H_1(\Sigma,\mathbb{Z}_2)$.

$$q_\Sigma(\alpha_1,\alpha_2)=\alpha_1\cdot\alpha_2 \pmod 2. \tag{3.8}$$

В частности, если класс гомологий задан простой замкнутой кривой C, то $C^2 = 1$ в том и только том случае, если окрестность кривой C – лист Мёбиуса. Легко видеть, что любая симметрическая форма соответствует некоторой римановой поверхности и однозначно определяет ее гомотопический, топологический и гладкий тип.

Теорема Фридмана [11] гарантирует справедливость этих утверждений и в четырехмерном случае для топологического типа: каждая унимодулярная форма соответствует односвязному ориентированному топологическому многообразию. Если форма четна, то топологическое многообразие одно, а если нечетно, то таких многообразий два.

В отличие от двумерного случая для гладкого 4-многообразия форма пересечения не может быть любой. Первые запреты начинаются с теоремы Рохлина об индексе гладких многообразий с четными формами (см. ниже элементарное доказательство, использующее индексы операторов Дирака). В гладком случае имеется существенная разница между определенными и неопределенными формами. Напомним, что разложение (2.5) определяет два числа $b^{\pm}$ (2.6). Их сумма $b_2 = b^+ + b^-$ – второе число Бетти нашего многообразия, а их разность $\sigma = b^+ - b^-$ – сигнатура нашего многообразия – зависит от ориентации. Определенные формы – это те, у которых либо $b^+ = 0$, либо $b^- = 0$.

Самое сильное утверждение в гомотопической теории односвязных гладких многообразий содержит следующая теорема Дональдсона.

Теорема 3.1. *Определенная форма гладкого односвязного 4-многообразия X является целочисленной суммой квадратов.*

Иначе говоря, гомотопический тип такого многообразия с точностью до ориентации определяется вторым числом Бетти.

Доказательство этой теоремы рекордно короткое (опять же по модулю всей теории Дональдсона). Пусть наша форма q_X отрицательно определена. Рассмотрим для общей метрики на X многообразие $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(1)$ модулей $\mathrm{SU}(2)$-инстантонов с $c_2 = 1$ (называемых обычно 1-инстантонами). Согласно результатам раздела 2.4 $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(1)$ – либо гладкое пятимерное многообразие (см. формулу (2.33)) вне конечного числа простых особых точек, соответствующих приводимым связностям, либо пусто. Каждая приводимая связность соответствует разложению расслоения $E = L \oplus L^*$ и связности $a = a_L \oplus a_{L^*}$, где a_L – антиавтодуальная абелева связность. Но поскольку $c_2(E) = 1$, то $c_1(L)^2 = -1$. Далее, компактификация $\overline{\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(1)}$ содержит идеальные связности вида $([a], x)$ (см. (3.1) и (3.6)), где $[a]$ – тривиальная плоская связность на тривиальном расслоении, а x – любая точка нашего многообразия X. Такие связности, конечно, существуют и являются идеальными антиавтодуальными связностями. Локальное многообразие деформаций таких решений пятимерно и содержит неприводимые антиавтодуальные связности. Значит,

(1) пятимерное пространство $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(1)$ не пусто;
(2) компактификация $\overline{\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(1)}$ доставляет гладкий ориентированный бордизм между X и несвязным объединением линков особых точек – приводимых связностей;
(3) линк каждой особой точки есть $\mathbb{CP}^2$ с обращенной ориентацией.

Сильнейшая теорема гомотопической теории гладких 4-многообразий доказана.

Перейдем теперь к случаю неопределенных форм: если форма q_X нечетная, то она представима в виде

$$q_X = \sum_1^{b^+} x_i^2 - \sum_1^{b^-} y_j^2; \tag{3.9}$$

а если четная, то она имеет вид

$$q_X = 2kE_8 \oplus mH, \tag{3.10}$$

где E_8 – определенная стандартная форма ранга 8, H – стандартная гиперболическая форма ранга 2, а коэффициент при E_8 четный по теореме Рохлина. Этот результат показывает, что нечетные формы реализуются все в качестве форм пересечений гладких многообразий. Для четных форм проблема открыта при $k \geqslant 1$. Результаты, имеющиеся на сегодняшний день в этой задаче, следующие:

(1) Дональдсон (1984 г.)

$$k \geqslant 1 \implies m \geqslant 3; \tag{3.11}$$

(2) Кронхеймер–Мровка (1994 г.)

$$k \geqslant 2 \implies m \geqslant 6; \tag{3.12}$$

(3)

$$k \geqslant 3 \implies m \geqslant 9. \tag{3.13}$$

Заметим, что для K3-поверхности $k = 1, m = 3$ и, значит, связные суммы K3-поверхностей и квадрик реализуют все формы при $m \geqslant 3k$.

Последний шаг гомотопической классификации гладких 4-многообразий –

$\frac{11}{8}$-ГИПОТЕЗА: $3k \leqslant m$.

Заметим, что Фурута анонсировал решение проблемы "$\frac{10}{8}$" и что для 4-многообразий, подлежащих алгебраическим поверхностям, гипотеза следует из неравенства Богомолова–Мияока–Яо (см., например, [22]). Геометрическое следствие гипотезы – существование топомодели любого односвязного гладкого 4-многообразия:

$$\begin{aligned} q_X \text{ – нечетна } &\implies X \sim b^+\mathbb{CP}^2 \# b^-\overline{\mathbb{CP}^2}, \\ q_X \text{ – четна } &\implies X \sim \pm\frac{\sigma}{16}K \# (m-3k)Q, \end{aligned} \tag{3.14}$$

где $\sim$ – топологическая эквивалентность, $\#$ – операция связной суммы, $\overline{\mathbb{CP}^2}$ – комплексная проективная плоскость с обращенной ориентацией, $\pm K$ – K3-поверхность со стандартной или обращенной ориентацией и Q – комплексная квадрика, $Q = \mathbb{CP}^1 \times \mathbb{CP}^1$.

Мы видим, что, как и в двумерном случае, каждое гладкое односвязное 4-многообразие может быть представлено топологически как связная сумма проективных плоскостей, "торов" (т.е. произведений сфер соответствующей размерности) и кватернионных эллиптических кривых – K3-поверхностей (с точностью до ориентации). Однако гладкая классификация гораздо богаче: не всякая алгебраическая поверхность гладко эквивалентна своей топомодели. Замечательный результат заключается в том, что для алгебраических поверхностей с $b^+ > 1$ гладкая структура ее топомодели является экзотической, т.е. не совпадает с ее подлежащей гладкой структурой.

Здесь мы уже прочно привязаны к опыту алгебраической геометрии (см., например, [21]), для которой описанные в следующем разделе конструкции в их алгебро-геометрическом варианте давно уже стали привычными (если не сказать "банальными") (см. оригинальную работу Мукая [14]).

3.3. μ-классы. Основная идея следующих построений заключается в том, что когомологические классы множества, параметризующего орбиты в семействе связностей, могут быть подняты с подлежащего многообразия.

А именно, мы будем искать гомологические классы пространств $\mathscr{B}$ и $\mathscr{B}^*$.

Отметим, что при изучении топологических свойств этих пространств трудности могут возникнуть из несвободы действия калибровочной группы на пространстве связностей. Даже в случае неприводимых связностей стабилизатор Γ_a может быть нетривиальным – равным центру $C(G)$. Поэтому обычно удобно работать с оснащенными связностями.

Пусть на подлежащем многообразии отмечена некоторая точка x_0. Тогда оснащенной связностью на главном расслоении P называется пара (a, f), где a – связность, а f – эквивариантный по действию G изоморфизм $\phi\colon G \to P_{x_0}$. В наших рассмотрениях это равносильно заданию ортонормированного базиса в слое расслоения E_{x_0}. Калибровочная группа естественно действует на пространстве оснащенных связностей, поэтому можно определить

$$\mathscr{B}_f = (\mathscr{A} \times \mathrm{Hom}(G, P_{x_0}))/\mathscr{G}. \tag{3.15}$$

Другой способ определения $\mathscr{B}_f$ – рассмотрение подгруппы калибровочной группы $\mathscr{G}_0 \subset \mathscr{G}$ такой, что

$$\mathscr{G}_0 = \{u \in \mathscr{G} \mid u(x_0) = \mathrm{id}\}. \tag{3.16}$$

Тогда $\mathscr{B}_f = \mathscr{A}/\mathscr{G}$ и вместе с тем имеется естественная проекция $\beta\colon \mathscr{B}_f \to \mathscr{B}$. В первом определении β – отображение, забывающее фиксированный в точке x_0 базис.

Стабилизатор Γ_a состоит из ковариантно-постоянных преобразований, подгруппа $\mathscr{G}_0$ действует свободно на $\mathscr{A}$, следовательно, $\mathscr{B}_f$ банахово многообразие. Слой отображения β в точке $[a]$ изоморфен G/Γ_a, где Γ_a понимается как подгруппа G через отождествление $\mathscr{G}/\mathscr{G}_0 \cong G$.

Построим семейство оснащенных связностей, параметризованное $\mathscr{B}_f$. Пусть $\pi_2\colon \mathscr{A} \times X \to X$ – проекция на второй сомножитель, тогда $P' \to \mathscr{A} \times X$ определяется как поднятие $\pi_2^*(P)$. Поэтому $P' = \mathscr{A} \times P$. Тогда на P' поднимается семейство связностей $\mathscr{A}'$, так что на срезе P_a над $a \times X$ связность совпадает с $\pi_2^*(a)$. Если выбор базиса f в x_0 сделан, тогда мы получаем оснащенность и для всего семейства f'. Группа $\mathscr{G}_0$ действует свободно на $\mathscr{A} \times X$, так же как и на P', поэтому можно говорить о фактор-расслоении

$$\begin{gathered} \mathbb{P}_f \to \mathscr{B}_f \times X, \\ \mathbb{P}_f = P'/\mathscr{G}_0. \end{gathered} \tag{3.17}$$

Семейства связностей $\mathscr{A}'$ и f' сохраняются при действии $\mathscr{G}_0$, поэтому фактор-расслоение (3.17) наследует семейство базисных связностей $(\mathbb{A}', \mho)$.

Пространство $\mathscr{B}^*$ не параметризует никакое универсальное семейство. Но можно действовать так: пусть $\mathscr{A}^* \subset \mathscr{A}$ – подпространство неприводимых связностей; тогда можно определить $P' \to \mathscr{A}^* \times X$ как поднятие расслоения $P' = \mathscr{A}^* \times P$. Как и выше, можно поднять семейство связностей. Калибровочная группа действует на этом семействе, но не действует свободно на базе $\mathscr{A}^* \times X$, кроме случая, когда центр группы тривиален. Так как $C(G)$ действует тривиально на базе и нетривиально на расслоении P', фактор будет не G-расслоением, но G^{ad}-расслоением, структурная группа которого есть $G/C(G)$. И возможно определить

$$\mathbb{P}^{\mathrm{ad}} \to \mathscr{B}^* \times X \tag{3.18}$$

как фактор $\mathbb{P}^{\mathrm{ad}} = P'/\mathscr{G}$.

В наших рассмотрениях, когда $G = \mathrm{SU}(2)$, $\mathbb{P}^{\mathrm{ad}}$ будет $\mathrm{SO}(3)$-расслоением над $\mathscr{B}^* \times X$.

Чтобы описать в этом случае когомологии $\mathscr{B}_f$ и $\mathscr{B}^*$, необходимо использовать естественное произведение

$$/ \colon H^d(\mathscr{B}_f \times X) \times H_j(X) \to H^{d-j}(\mathscr{B}_f). \tag{3.19}$$

(Заметим, что символ / – стандартное обозначение slant-произведения.) Для любого характеристического класса c, связанного с группой G, существует класс когомологий $c(\mathbb{P}_f) \in H^d(\mathscr{B}_f \times X)$, где $d = \deg(c)$. И отображение определяется как “свертка”

$$\begin{gathered} \mu_c^f \colon H_j(X) \to H^{d-j}(\mathscr{B}_f), \\ \mu_c^f(\alpha) = c(\mathbb{P}_f)/\alpha. \end{gathered} \tag{3.20}$$

Сходным образом определяются классы на $\mathscr{B}^*$, но на этот раз берется характеристический класс группы G^{ad}, и отображение

$$\begin{gathered} \mu_c \colon H_j(X) \to H^{d-j}(\mathscr{B}^*), \\ \mu_c(\alpha) = c(\mathbb{P}^{\mathrm{ad}})/\alpha, \end{gathered} \tag{3.21}$$

задает классы когомологий факторпространства неприводимых связностей.

Продолжим рассуждения определением μ-классов в нашем конкретном случае. Для главного $\mathrm{SU}(2)$-расслоения отображение $\mu^f \colon H_2(X,\mathbb{Z}) \to H^2(\mathscr{B}_f,\mathbb{Z})$ задается формулой

$$\mu^f(\Sigma) = c_2(\mathbb{P}_f)/[\Sigma], \tag{3.22}$$

отображение $\mu \colon H_2(X,\mathbb{Q}) \to H^2(\mathscr{B}^*,\mathbb{Q})$ задается сходным образом:

$$\mu(\Sigma) = -\frac{1}{4}\, p_1(\mathbb{P}^{\mathrm{ad}})/[\Sigma]. \tag{3.23}$$

Второе из этих определений подходит и тогда, когда $G = \mathrm{SO}(3)$; в каждом из случаев $\mathbb{P}^{\mathrm{ad}}$ является $\mathrm{SO}(3)$-расслоением.

Определения, представленные выше, дают отображения средних когомологий подлежащего многообразия. Кратко опишем случаи $\mu_{c_2}^f \colon H_j(X) \to H^{4-j}(\mathscr{B}^*)$, когда $j = 1$ и 3. Каждый из них имеет прямую геометрическую интерпретацию.

Пусть γ – замкнутый путь, начинающийся и заканчивающийся в x_0 и представляющий класс $[\gamma] \in H^1(X,\mathbb{Z})$. Для любой связности a обозначим через $h_\gamma(a)$ голономию связности вдоль замкнутого контура. Это автоморфизм слоя P_{x_0}, зависящий от класса эквивалентности a как отмеченной связности и определяющий отображение

$$h_\gamma \colon \mathscr{B}_f = (\mathscr{A}/\mathscr{G}_0) \to \mathrm{SU}(2) \cong S^3. \tag{3.24}$$

Следовательно, мы получаем класс когомологий $h_\gamma^*(\omega) \in H^3(\mathscr{B}_f)$ поднятием фундаментального класса $\omega \in H^3(S^3)$, и нетрудно доказать, что этот класс когомологий совпадает с $\mu_{c_2}^f([\gamma])$.

Теперь рассмотрим отображение $\mu_{c_2}^f \colon H^3(X) \to H^1(\mathscr{B}_f)$. Если $[Y] \in H^3(X)$ – класс, представителем которого является вложенное 3-многообразие $Y \subset X$, тогда для любой связности a на X можно вычислить инвариант Черна–Саймонса для ограничения $a|_Y$. Этот инвариант $\tau_Y(a)$ принимает значения в S^1 и, следовательно, определяет отображение $\tau_Y \colon \mathscr{B}_f \to S^1$. И снова из фундаментального класса, но теперь уже S^1, при поднятии получаем элемент из $H^1(\mathscr{B}_f)$. Тождественность этого класса с $\mu_{c_2}^f([Y])$ легко выводится из определения второго класса Черна через кривизну в теории Черна–Вейля.

Но вернемся к двумерным когомологиям. В случае односвязного многообразия образ отображения, определенного формулой (3.20), порождает все рациональные когомологии $\mathscr{B}_f$. Вообще верен следующий факт: если P – главное $\mathrm{SU}(2)$-расслоение над односвязным 4-многообразием и $\Sigma_1, \dots, \Sigma_{b_2}$ – базис в $H_2(X, \mathbb{Z})$, тогда кольцо рациональных когомологий $H^*(\mathscr{B}_f, \mathbb{Q})$ есть полиномиальная алгебра на образующих $\mu^f(\Sigma_1), \dots, \mu^f(\Sigma_{b_2})$. В частности, $H^{2k}(\mathscr{B}_f, \mathbb{Q}) \cong S^k(H_2(X, \mathbb{Q}))$.

Этот результат может быть использован для вычислений рациональных когомологий $\mathscr{B}^*$ при помощи поднятия, задаваемого отображением β. Класс $\mu(\Sigma) \in H^2(\mathscr{B}^*, \mathbb{Q})$ поднимается до класса $\mu^f(\Sigma)$, но в этом случае данные классы не являются образующими кольца когомологий базы. Необходимо еще добавить 4-мерный класс

$$\nu = -\frac{1}{4}\, p_1(\beta) \in H^4(\mathscr{B}^*, \mathbb{Q}), \tag{3.25}$$

где $p_1(\beta)$ – класс Понтрягина β как $\mathrm{SO}(3)$-расслоения. Это определение может быть рассмотрено как пример общей конструкции $\mu_c(\alpha)$ в случае, когда $c = -\frac{1}{4}p_1$ и $\alpha = [x_0] \in H_0(X)$.

Сходное утверждение формулируется для кольца когомологий $H^*(\mathscr{B}^*, \mathbb{Q})$, а именно, это полиномиальная алгебра на образующих – одном четырехмерном и b_2 двумерных:

$$H^*(\mathscr{B}^*, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[\nu, \mu(\Sigma_1), \dots, \mu(\Sigma_{b_2})]. \tag{3.26}$$

Рассмотрим следующий пример. Пусть в качестве подлежащего многообразия взята риманова поверхность S, и $G = \mathrm{U}(1)$. Пространства $\mathscr{B}_f, \mathscr{B}, \mathscr{B}^*$ все совпадают в этом случае. Так как в случае комплексной размерности 1 нет условий интегрируемости, любая связность на линейном расслоении $L \to S$ задает голоморфную структуру на L. Это определяет отображение $\mathscr{B} \to \mathrm{Pic}_k(S)$, где Pic_k – торы классов изоморфных голоморфных линейных расслоений степени k. Такое отображение сохраняет гомотопическую эквивалентность, слои его – пространство всех эрмитовых метрик на L. Следовательно, когомологии $\mathscr{B}$ те же, что и на якобиане, а так как последний есть $2g$-тор, то $H^*(\mathscr{B}, \mathbb{Z})$ – внешняя алгебра с $2g$ одномерными образующими. Отождествив их с классами $\mu_{c_1}(\alpha), \alpha \in H_1(S)$, получаем обычное описание якобиана как фактора $\mathbb{R}^{2g}$ по решетке периодов.

3.4. Инварианты Дональдсона. Как всегда, начнем с простого случая – случая нульмерного многообразия модулей инстантонов.

Пусть X – односвязное 4-многообразие с $b^+(X) > 1$ (условие, устраняющее зависимость от выбора метрики), и пусть $E \to X$ – расслоение со структурной группой $G = \mathrm{SO}(3)$. Пусть виртуальная размерность многообразия модулей равна нулю: $8k - 3(1 + b^+) = 0$. Тогда для общей метрики g верны следующие утверждения:

(1) многообразие модулей $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(E, g)$ содержит только неприводимые связности;
(2) $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(E, g)$ состоит из конечного числа точек;
(3) выбирая ориентацию, можно присвоить знак каждой точке $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(E, g)$.

Выбор ориентации зависит от выбора ее на расслоении $\Lambda = \det\mathrm{ind}(\delta, \mathrm{ad}\, E)$, однако такой выбор становится каноническим, если зафиксировать ориентацию на $H^+(X_0)$ и класс эквивалентности целочисленного подъема $w_2(E)$ в случае $\mathrm{SO}(3)$-расслоения.

$\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(E, g)$ в этом случае, очевидно, компактно, так как при меньших k антиавтодуальных связностей нет, а значит, нет и предельных идеальных связностей, все пределы – действительные. Это дает компактность $\mathscr{M}_{\mathrm{asd}}(E, g)$, равносильную конечности числа точек.

Определим инвариант как целое число

$$q = \sum_{[a] \in \mathscr{M}} \varepsilon(a). \tag{3.27}$$

A priori это число зависит от метрики, выбора ориентации на $H^+(X)$ и целочисленного подъема.

Замечательное свойство такого "числа точек многообразия модулей, взятых со знаками", заключается в том, что для двух общих метрик g_0 и g_1 имеем равенство

$$q(g_0) = q(g_1). \tag{3.28}$$

В качестве примера рассмотрим K3-поверхность. Пусть

$$\alpha \in H^2(X, \mathbb{Z}_2), \qquad \alpha^2 = 2 \pmod 4.$$

Рассмотрим $\mathrm{SO}(3)$-расслоение F такое, что $w_2(F) = \alpha$ и $p_1(F) = -6$.

Так как для K3-поверхности $b^+(X) = 3$, виртуальная размерность многообразия модулей равна

$$\dim \mathscr{M}_F = -2p_1(F) - 3(1 + 3) = 0. \tag{3.29}$$

Значит, мы находимся в ситуации, когда можно определить инвариант X. Для этого необходимо выбрать ориентацию Ω положительной части $H^2(X)$. Форма пересечения K3-поверхности четна, поэтому зависимости от подъема α нет. Запишем инвариант как $q(\alpha, \Omega)$.

Верно следующее утверждение: существуют такие α и Ω, что $q(\alpha, \Omega) = 1$.

Следствия представляют интересные результаты для K3-поверхностей:

(1) Не существует диффеоморфизма, действующего тривиально на $H^2(X, \mathbb{Z}_2)$, но обращающего ориентацию на положительной части $H^2(X, \mathbb{R})$. (То есть комплексная ориентация K3-поверхности определяет и ее спинорную ориентацию.)
(2) Существует односвязный пятимерный h-кобордизм K3-поверхности, не являющийся прямым произведением.
(3) Не существует разложения в связную сумму $X = Y \# (S^2 \times S^2)$.

Теперь обратимся к более общей ситуации.

Пусть теперь $E \to X$ – расслоение со структурной группой $\mathrm{SU}(2)$. Инварианты будут представляться в виде пересечений $\langle \beta, [\mathscr{M}_k] \rangle$, где β – результат пересечений классов вида $\mu(\sigma)$, а $[\mathscr{M}_k]$ – фундаментальный класс многообразия модулей инстантонов. Так как классы $\mu(\sigma)$ двумерны, необходимо потребовать, чтобы виртуальная размерность $\mathscr{M}_k$ была четна: $\dim \mathscr{M}_k = 2d$,

$$d = d(k) = 4k - \frac{3}{2}(b^+(X) + 1) \in \mathbb{Z}. \tag{3.30}$$

Как и выше, потребуем $b^+ > 1$ и добавим, исходя из (3.30), условие нечетности.

Пусть $[\Sigma_1], \dots, [\Sigma_d]$ – классы в $H_2(X, \mathbb{Z})$, тогда $\mu(\Sigma_i)$ – поднятия их в $H^2(\mathscr{B}^*, \mathbb{Z})$. Их произведение имеет степень $2d$, поэтому можно определить целое число

$$q = \langle \mu(\Sigma_1) \smile \dots \smile \mu(\Sigma_d), [\mathscr{M}_k] \rangle. \tag{3.31}$$

Ориентация $\mathscr{M}_k$ зависит от ориентации Ω пространства $H^+(X)$, поэтому мы должны обозначать инварианты как $q_{k,\Omega}$. Тогда запишем свойства инвариантов:

(1) $q_{k,\Omega}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_d)$ зависят от аргументов только как от классов гомологий;
(2) $q_{k,\Omega}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_d)$ полилинейны и симметричны по $[\Sigma_i]$;
(3) $q_{k,\Omega} = -q_{k,-\Omega}$;
(4) если $f\colon X \to Y$ – сохраняющий ориентацию диффеоморфизм, тогда

$$q_{k,f^*\Omega}(f(\Sigma_1), \dots, f(\Sigma_d)) = q_{k,\Omega}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_d). \tag{3.32}$$

Такие инварианты строятся для достаточно больших k. Точное условие на величину k следующее:

$$d(k) \geqslant 2k + 1, \tag{3.33}$$

или, то же самое, $k \geqslant \frac{1}{4}(3b^+(X) + 5)$. Это ограничение объясняется просто: виртуальная размерность многообразия модулей инстантонов превышает размерность наименьшего страта $\mathscr{M}_0 \times S^k(X)$ компактификации $\overline{\mathscr{M}_k}$ по меньшей мере на два, а это означает, что $\overline{\mathscr{M}_k}$ в общем случае гладкое многообразие, за исключением множества коразмерности два или более, что и обычно для особенностей комплекса, обладающего фундаментальным классом.

С помощью этих новых инвариантов возможно доказывать старые гипотезы, передоказывать старые теоремы и получать новые. Например, Дональдсон доказал с их помощью следующее утверждение.

Теорема 3.2. *Пусть X – односвязное 4-многообразие с нечетным $b^+(X)$, и предположим, что X раскладывается в связную сумму $X = X_1 \# X_2$, причем $b^+(X_i) > 0$, $i = 1, 2$. Тогда $\mathrm{SU}(2)$-инварианты q_k и $\mathrm{SO}(3)$-инварианты $q_{k,\alpha}$ (для любых k и $\alpha \neq 0$) тождественно равны нулю.*

Этот результат не имел бы смысла, если бы инварианты Дональдсона были тривиальны почти всегда. Но для алгебраических и симплектических многообразий они нетривиальны, поэтому использование теории Дональдсона в современной математике приводит к возрождению интереса к алгебраической геометрии: все топомодели алгебраических поверхностей (кроме элементарных) допускают вышеописанное разложение, а значит, топомодели не диффеоморфны подлежащим 4-многообразиям алгебраических поверхностей.

С другой стороны, исследование гладкостей подчеркивает близость комплексных и симплектических структур, и Дональдсон далеко продвинулся в описании этой “близости” (см. [4], [5]).

Столь принципиальное отличие дифференциальной топологии от топологии в четырехмерном случае на некоторое время привело в замешательство и физиков. Причем это коснулось двух диаметрально противоположных областей: традиционно элитарной квантовой гравитации (инициированной Тулио Редже) и сугубо практических вычислений на решетках с использованием метода Монте-Карло (см., например, [1]). Все дело в том, что комбинаторные конструкции такие, как, например, метод динамической триангуляции, используют PL-топологию 4-многообразий. А, как известно, PL-структуры и гладкости в четырехмерной геометрии совпадают. От этого временного замешательства выиграли математики: они немедленно применили хорошо известные статистические приемы к совокупности инвариантов $q_{k,\Omega}$ (3.31). Идея проста: собрать все инварианты вместе в “статсумму”

$$q_\Omega = \sum_0^\infty \frac{q_{k,\Omega}}{k!}\,. \tag{3.34}$$

Подобно тому, как в теории динамических триангуляций аналитика статсумм приводит к нахождению и локализации критических точек, аналитика функции (3.34) привела Кронхеймера и Мровку к замечательному наблюдению: при естественных условиях на 4-многообразие X (так называемая “простота типа” подлежащего многообразия) существует конечное множество классов когомологий

$$\{k_1,\ldots,k_N\}_{KM} \subset H^2(X,\mathbb{Z}) \tag{3.35}$$

таких, что каждый полином Дональдсона содержится в рациональной оболочке

$$q_{k,\Omega} \in \mathbb{Q}[q_X, k_1,\ldots,k_N] \tag{3.36}$$

(здесь форма пересечений q_X рассматривается как квадратичная форма на решетке $H^2(X,\mathbb{Z})$, а классы k_i – как линейные формы). А вся статсумма имеет очень простой вид

$$q_\Omega = \exp\left(\frac{q_X}{2}\right)\sum_{i=1}^N n_i \exp(k_i). \tag{3.37}$$

Эти классы были названы фундаментальными классами, и читатель-физик без сомнения заметит, что они являются аналогами фаз сильного, слабого взаимодействий и “полимеризации” для асимптотик динамических триангуляций.

Эти классы действительно фундаментальны и играют роль канонического класса алгебраической поверхности для гладкого случая. В частности, как линейный член они входят в формулу присоединения для оценки рода реализации класса 2-гомологий гладкой римановой поверхностью (см. ниже).

Здесь мы отметим пока только одно их свойство: множество (3.35) инвариантно относительно обращения знака, т.е. если класс k_i фундаментальный, то и класс

$-k_i = k_{-i}$ тоже фундаментальный. Более того, константа $n_{-i} = (-1)^{\frac{b^+ + 1}{2}}$. Поэтому, рассматривая формальные переменные $t_i = \exp(k_i)$ и убирая из статсуммы (3.37) топологический множитель $\exp(q_X/2)$, мы получаем полином Лорана

$$KM_X = n_0 + \sum n_i\big(t_i + (-1)^{\frac{b^+ + 1}{2}} t_i^{-1}\big), \tag{3.38}$$

который (как мы увидим ниже) не случайно напоминает полином Александера линка в S^3.

В частности, если переменная только одна, то KM_X является А-полиномом: $n_0 + \sum_{i=1}^N n_i(t^i + t^{-i})$ и $n_0 + \sum_{i=1}^N n_i = \pm 1$. Напомним, что любой такой полином является полиномом Александера узла в S^3. Мы обсудим эти "совпадения" в § 6 этого обзора.

Наконец, заметим, что конфигурация теории Янга–Миллса (как классической теории поля) слишком проста, несмотря на блестящие физические приложения (отмеченные двумя нобелевскими премиями). Выбор более сложных конфигураций приводит к следующему этапу – теории Зайберга–Виттена.

§ 4. Инварианты Зайберга–Виттена

4.1. Алгебры Клиффорда. Для произвольного n-мерного вещественного векторного пространства V с невырожденной квадратичной формой q алгеброй Клиффорда $C(V,q)$ называется фактор тензорной алгебры $T(V)$ по идеалу, содержащему элементы вида $v \otimes v - q(v) \cdot 1$. Универсальность алгебры $C(V,q)$ заключается в том, что если существует какое-либо линейное отображение пространства V в некоторую алгебру K, причем форма при этом сохраняется (т.е. образ любого вектора, возведенный в квадрат, должен быть равен значению формы на этом векторе, умноженному на единицу алгебры), то это отображение пропускается через каноническое вложение пространства V в алгебру Клиффорда $C(V,q)$.

Очевидно, что если выбрать базис в V, например, канонический для формы q, тогда алгебра Клиффорда задается соотношениями

$$\begin{gathered} e_j^2 = -1, \\ e_i \cdot e_j = -e_j \cdot e_i. \end{gathered} \tag{4.1}$$

Базисом алгебры как вещественного векторного пространства будут мономы вида

$$\begin{gathered} e_I = e_{i_1} \cdot \ldots \cdot e_{i_k}, \\ \{i_1, \ldots, i_k\} \subset \{1, \ldots, n\}, \end{gathered} \tag{4.2}$$

причем наборы строго упорядочены. Число k обычно называется степенью монома.

Очевидно, размерность алгебры равна 2^n, и имеется $\mathbb{Z}_2$-градуировка, отвечающая разложению на мономы четной и нечетной степени C^+ и C^-, причем C^+ – подалгебра в алгебре Клиффорда.

В случае четного n в центре алгебры лежат только константы. В нечетном случае добавляются элементы максимальной степени.

Алгебра Клиффорда допускает подъем скалярного произведения, определяемого формой q, а именно, если элементы алгебры x и y имеют в каноническом базисе координаты x_I и y_I соответственно, тогда произведение представляется естественно как

$$(x, y) = \sum_I x_I \cdot y_I.$$

Кроме того, существует еще и естественная инволюция $C(V) \to C(V)$, определяемая по формуле

$$\overline{x} = \sum_I \varepsilon_I \cdot x_I \cdot e_I, \qquad \varepsilon_I = (-1)^{\frac{1}{2}k(k+1)}, \tag{4.3}$$

где $|I| = k$, причем нетрудно показать, что $\overline{x \cdot y} = \overline{y} \cdot \overline{x}$. Несмотря на определение в терминах некоторого базиса, ни внешнее произведение, ни инволюция от выбора базиса не зависят. Они связаны следующим соотношением:

$$(\overline{x} \cdot y)_0 = (x, y). \tag{4.4}$$

Для доказательства достаточно заметить, что $e_I^2 = \varepsilon_I$.

Вообще классификация алгебр Клиффорда достаточно проста. Рассмотрим сначала несколько примеров. Мы будем обозначать парой нижних индексов сигнатуру формы. Тогда для вещественного случая имеем:

(1) $C(\mathbb{R}, q_{0,1}) = \mathbb{C}$, а если сигнатура формы имеет обратный знак, то

$$C(\mathbb{R}, q_{1,0}) = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}; \tag{4.5}$$

(2) $C(\mathbb{R}^2, q_{0,2}) = \mathbb{H}$, так как порождается элементами e_1, e_2 и $e_1 \cdot e_2$, умножающимися по тем же правилам, что и i, j, k; в двух других случаях $C(\mathbb{R}^2, q)$ есть просто алгебра матриц $\mathrm{Mat}_2(\mathbb{R})$;

(3) известны рекуррентные соотношения

$$\begin{aligned} C(\mathbb{R}^2, q_{1,1}) \otimes C(\mathbb{R}^{l+m}, q_{l,m}) &= C(\mathbb{R}^{l+m+2}, q_{l+1,m+1}), \\ C(\mathbb{R}^2, q_{2,0}) \otimes C(\mathbb{R}^{l+m}, q_{l,m}) &= C(\mathbb{R}^{l+m+2}, q_{m+2,l}), \\ C(\mathbb{R}^2, q_{0,2}) \otimes C(\mathbb{R}^{l+m}, q_{l,m}) &= C(\mathbb{R}^{l+m+2}, q_{m,l+2}), \end{aligned} \tag{4.6}$$

которые несложно вывести, рассматривая все в канонических базисах.

Из соотношений (4.6) следует, что любая алгебра Клиффорда для квадратичной формы максимального ранга является либо матричной алгеброй над $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ или $\mathbb{H}$, либо прямой суммой двух одинаковых матричных алгебр.

В случае комплексного векторного пространства классификация еще более простая – если размерность пространства четна, тогда алгебра Клиффорда изоморфна матричной алгебре $\mathrm{Mat}_{2^{\frac{1}{2}\dim V}}(\mathbb{C})$, в нечетном случае – прямой сумме двух таких алгебр.

Элемент алгебры Клиффорда $x \in C(V)$ называется единицей, если существует обратный ему x^{-1}.

Обозначим через $\mathrm{Spin}(V)$ множество элементов алгебры, удовлетворяющих соотношениям

$$\overline{x} \cdot x = 1, \qquad x \cdot V \cdot \overline{x} = V, \qquad x \in C^{+}(V). \tag{4.7}$$

Если размерность V четна, то третье условие является следствием первых двух.

Эта конструкция позволяет построить двулистное нетривиальное накрытие группы $\mathrm{SO}(n)$. Если $\dim V$ больше двух, тогда группа $\mathrm{Spin}(V)$ компактна и односвязна, и гомоморфизм $\mathrm{Ad} : \mathrm{Spin}(V) \to \mathrm{SO}(V)$ задается присоединенным действием $x \in \mathrm{Spin}(V)$ на V, а именно,

$$\mathrm{Ad}(x)(v) = x \cdot v \cdot \overline{x}. \tag{4.8}$$

Доказательство этого факта основывается на рассмотрении алгебр Ли обеих групп, причем

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Spin}(V)) = C_2(V), \tag{4.9}$$

где $C_2(V)$ – подмножество элементов алгебры Клиффорда, имеющих вторую степень. Гомоморфизм $\mathrm{ad}\colon C_2 \to \mathfrak{so}(V)$, задаваемый, как обычно, в виде

$$\mathrm{ad}(x)(v) = [x, v], \tag{4.10}$$

инъективен, а значит, по соображениям размерностей, и биективен. Так как специальная ортогональная группа компактна и связна, то гомоморфизм Ad сюръективен. Ядро его состоит из таких элементов, которые коммутируют с векторами $v \in V$, то есть в точности из ± 1. Значит, это двулистное накрытие. Два элемента из ядра $+1$ и -1 могут быть связаны путем $\gamma\colon [0, \pi] \to \mathrm{Spin}(V)$, задаваемым формулой

$$\gamma(t) = \cos(t) + \sin(t) \cdot e_1 \cdot e_2. \tag{4.11}$$

Отсюда следует связность группы, и из того, что получается нетривиальное двулистное накрытие, следует, что $\mathrm{Spin}(V)$ компактна и односвязна. Последнее, кстати, также очевидно следует из того, что $\mathrm{Spin}(V)$ содержится в единичной сфере алгебры Клиффорда.

Перейдем к рассмотрению комплексификации алгебр Клиффорда.

Обозначим через $C^{\mathbb{C}}(V) = C(V) \otimes \mathbb{C}$ такую комплексификацию. Базис $\{e_I\}$ так и останется базисом, а координаты станут комплексными. Инволюция в этом случае запишется в виде

$$\overline{x} = \sum_I \varepsilon_I \cdot \overline{x_I} \cdot e_I, \tag{4.12}$$

как и выше, $\overline{x \cdot y} = \overline{y} \cdot \overline{x}$, и имеется эрмитова форма

$$\langle x, y \rangle = (\overline{x} \cdot y)_0 = \sum_I \overline{x_I} \cdot y_I. \tag{4.13}$$

Так же, как и в вещественном случае, группа $\mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}(V)$ определяется как множество элементов алгебры $x \in C^{+}(V) \otimes \mathbb{C}$ таких, что $\overline{x} \cdot x = 1$ и $x \cdot V \cdot \overline{x} = V$. Алгебра Ли такой группы представляется в виде прямой суммы $C_2(V) \oplus i\mathbb{R}$, и группа может быть записана в виде

$$\mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}(V) = \{e^{i\theta} \cdot x \mid \theta \in \mathbb{R},\ x \in \mathrm{Spin}(V)\}. \tag{4.14}$$

Следовательно, мы можем отождествить $\mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}(V) = \mathrm{Spin}(V) \times_{\mathbb{Z}_2} S^1$, где действие группы $\mathbb{Z}_2$, очевидно, диагональное. Такое отождествление дает точную последовательность

$$1 \to S^1 \to \mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}(V) \to \mathrm{SO}(V) \to 1, \tag{4.15}$$

где вторая стрелка – очевидное вложение окружности в $\mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}(V)$, а третья – отображение $\mathrm{Ad} : \mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}(V) \to \mathrm{SO}(V)$, строящееся так же, как и в вещественном случае.

Имеется и другая точная последовательность

$$1 \to \mathrm{Spin}(V) \to \mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}(V) \to S^1 \to 1, \tag{4.16}$$

в которой третья стрелка есть отображение $\delta\colon \mathrm{Spin}^{\mathbb{C}}(V) \to S^1$, задаваемое формулой $\delta(e^{i\theta} \cdot x) = e^{2i\theta}$.

4.2. Спинорные расслоения. Если размерность $\dim V = 2n$ четна, тогда комплексификация алгебры Клиффорда представляется как алгебра эндоморфизмов 2^n-мерного комплексного эрмитова пространства W. Более точно, такое отождествление есть изоморфизм алгебр $\Gamma\colon C^{\mathbb{C}}(V) \to \mathrm{End}\, W$, удовлетворяющий условиям

$$\begin{aligned} \Gamma(x+y) &= \Gamma(x) + \Gamma(y), \\ \Gamma(x \cdot y) &= \Gamma(x) \cdot \Gamma(y), \\ \Gamma(\overline{x}) &= \Gamma(x)^* \end{aligned} \tag{4.17}$$

для любых $x, y \in C^{\mathbb{C}}(V)$. В частности, если мы рассмотрим ограничение этого изоморфизма на естественно вложенное в алгебру само векторное пространство V, то для любого вектора $v \in V$ выполняются условия

$$\begin{aligned} \Gamma(v)^* + \Gamma(v) &= 0, \\ \Gamma(v)^* \cdot \Gamma(v) &= |v|^2 \cdot 1. \end{aligned} \tag{4.18}$$

Свойства этого изоморфизма определяют его универсальность вместе с универсальностью самой алгебры. А именно, если W' – комплексное эрмитово пространство размерности 2^n и Γ – линейное отображение $\Gamma\colon V \to \mathrm{End}\, W'$, удовлетворяющее (4.18), тогда Γ естественно продолжается до изоморфизма $\Gamma\colon C^{\mathbb{C}}(V) \to \mathrm{End}\, W'$, обладающего свойствами (4.17).

Приведем два примера.

Как мы видели в предыдущем разделе, алгебра Клиффорда пространства $\mathbb{R}^2$ может быть отождествлена с кватернионами, при этом $i = e_1$, $j = e_2$, $k = e_1 \cdot e_2$, а инволюция задается обычным сопряжением.

Тогда линейное отображение $\gamma\colon \mathbb{H} \to \mathbb{C}^{2\times 2}$ задается формулой

$$\gamma(x) = \begin{pmatrix} x_0 + ix_1 & x_2 + ix_3 \\ -x_2 + ix_3 & x_0 - ix_1 \end{pmatrix}. \tag{4.19}$$

Недолго проверить, что комплексификация отображения $\gamma^{\mathbb{C}}\colon \mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \to \mathbb{C}^{2\times 2}$ является изоморфизмом алгебр, удовлетворяющим (4.17).

Теперь рассмотрим отображение

$$\Gamma\colon \mathbb{H} \to \mathbb{C}^{4\times 4}, \tag{4.20}$$